

Selectiviteit natuurlijke vijanden voor Verimark®

Groep	Soort	Insecten stadia	Toepassingsmethode*	IOBC Klasse	
Sluipwespen	<i>Eretmocerus mundus</i>	Adulten	Druppeltoepassing	1	
Sluipwespen	<i>Encarsia formosa</i>	Larvale stadia	Druppeltoepassing	1	
		Adulten	Druppeltoepassing	1	
Sluipwespen	<i>Dacnusa sibirica</i>	Adulten	Druppeltoepassing	1	
Sluipwespen	<i>Diglyphus isaea</i>	Adulten	Druppeltoepassing	1	
Roofmijten	<i>Amblyseius swirskii</i>	Mix populatie	Druppel voor introductie	1	
Roofmijten	<i>Amblyseius swirskii</i>	Mix populatie	Druppel na introductie	1	
Roofmijten	<i>Amblydromalus limonicus</i>	Mix populatie	Druppel na introductie	1	
Roofmijten	<i>Phytoseiulus sp.</i>	Mix populatie	Druppeltoepassing	1	
Predator	<i>Delphastus catalinae</i>	Larvale stadia	Druppeltoepassing	1	
Predator	<i>Orius laevigatus</i>	Mix populatie	Druppel voor en na introductie	1	
Predator	<i>Orius laevigatus</i>	Mix populatie	Druppel voor introductie	1	
Predator	<i>Orius laevigatus</i>	Mix populatie	Druppel na introductie	1	
Predator	<i>Orius insidiosus</i>	Larvale stadia	Druppel na introductie	1	
Predator	<i>Macrolophus pygmaeus</i>	Adulten	Druppel na introductie	2	

Beoordeling volgens IOBC-classificatie (Hassan 1985)

Klasse 1	< 25% reductie
Klasse 2	25-50% reductie
Klasse 3	51-75% reductie
Klasse 4	>75% reductie