



FMC

**Twój sposób
na stonkę ziemniaczaną**

Coragen[®] 200 SC

Ochrona przed szkodnikami

powered by

RYNAXYPYR[®]

active ingredient

1 ha =
OPAKOWANIE
50 ml

Dowiedz się więcej: www.coragen.pl

DLACZEGO CORAGEN® 200 SC

- Ograniczenia neonikotynoidów:
tiametksam poza rynkiem
- Słabe działanie pyretroidów
(wysokie temperatury, uodpornienia)
- Wysoka i długa skuteczność już od 50 ml/ha
- Czas skuteczności środka Coragen®
do 3 tygodni
- Działanie na wykluwające się larwy
(po zjedzeniu otoczki jaj opryskanych)
- Skuteczny w wyższych temperaturach
(w porównaniu do pyretroidów)
- Bezpieczny dla środowiska i owadów
pożytecznych



CORAGEN® 200 SC

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Uprawa: **ziemniak**
- Szkodnik: **stonka ziemniaczana**
(*Leptinotarsa decemlineata*)
- Dawka substancji: **10-12 g/ha**
- Dawka produktu: **50-62,5 ml/ha**
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: **2**
- Odstęp pomiędzy zabiegami min.: **10 dni**
- Karencja: **14 dni**
- Ilość wody: **150-400 l/ha**



KIEDY STOSOWAĆ NA STONKĘ ZIEMNIACZANĄ?

Biologia szkodnika: w Europie występuje 1-3 pokoleń w roku

Aplikacja ma głównie zwalczyć pierwsze pokolenie (produkt działa nawet do 3 tygodni)

CORAGEN® 50-62,5 ml/ha



Optymalny czas aplikacji: wystąpienie osobników dorosłych i jaj przed wykluwaniem

Unikać późnego stosowania, gdy są już widoczne uszkodzenia

W przypadku kolejnych nalotów, zabieg można powtórzyć po 14-21 dniach od pierwszej aplikacji.


CORAGEN® – DOSKONAŁA OCHRONA UPRAW ZIEMNIAKA PRZED STONKĄ ZIEMNIACZANĄ



Produkt był sprawdzany w wielu krajach, często przy bardzo dużej presji szkodnika.

CORAGEN® 200 SC W ZWALCZANIU STONKI W UPRAWIE ZIEMNIAKA

Skuteczność różnych dawek środka Coragen® w zwalczaniu larw stonki ziemniaczanej % skuteczności 3 dni po zabiegu



Coragen® 200 SC **50 ml**

Coragen® 200 SC **62,5 ml**

tiametoksam **80 g**

BADANIA REJESTRACYJNE, DŁUGOŚĆ DZIAŁANIA

Obiekt doświadczalny Bonin 2006	Dawki na 1 ha	Skuteczność wg Hendersona-Tiltona [%]											
		dni po zabiegu											
		3			7			14			21		
		L1-L2	L3-L4	L1-L4	L1-L2	L3-L4	L1-L4	L1-L2	L3-L4	L1-L4	L1-L2	L3-L4	L1-L4
Coragen® 200 SC	50 ml	100	100	100	100	96,5	98,1	100	100	100	100	100	100
Coragen® 200 SC	62,5 ml	100	100	100	100	94,8	98,0	100	100	100	100	100	100
tiametoksam (aktualnie substancja wycofana z UE)	80 g	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Coragen® i Rynaxypyr® są znakami towarowymi FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.