



FMC



Successor[®] Tx 487,5 SE

Ochrona przed chwastami

Dobry start kukurydzy

WCZESNA ELIMINACJA KONKURENCJI CHWASTÓW JEDNO- I DWULIŚCIENNYCH ZAPEWNIAJĄCA KUKURYDZY DOBRE WARUNKI DO WZROSTU

DWUSKŁADNIKOWY HERBICYD O SILNYM DZIAŁANIU NALISTNYM I ODGLEBOWYM

Posiada praktycznie pełne spektrum zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Oba składniki produktu zapobiegają wtórnemu zachwaszczeniu. Dobrze sprawuje się solo oraz jako komponent bardziej złożonych rozwiązań.

- Unikatowe, jedyne takie na rynku, połączenie dwóch substancji czynnych – petoksamidu z terbutyloazyną
- Doskonałe działanie nalistne jak i odglebowe, trwale ograniczające wystąpienie wtórnego zachwaszczenia
- Możliwość elastycznego dobrania terminu stosowania
- Doskonałe efekty w stosowaniu samodzielny, jak i w mieszaninach
- Bezpieczeństwo rośliny uprawnej

CHWASTY WRAŻLIWE:

chwastnica pospolita,
gwiazdnica pospolita,
iglica pospolita,
jasnota purpurowa,
komosa biała,
maruna bezwonna,
przetacznik perski,
przytulia czepna,

psianka czarna,
rdestówka powojowata
(rdest powojowaty),
samosiewy rzepaku,
szarłat szorstki,
tasznik pospolity,
tobołki polne,
włośnica sina.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA:

Termin stosowania:

Środek stosować po siewie, ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09) lub od fazy gdy powstaje pierwszy liść do fazy 4 liści kukurydzy (BBCH 10-14).

Zalecana dawka: 4,0 l/ha.

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.



**ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM
BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE
ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ
NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW
BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.**