




An Agricultural  
Sciences Company

## Бефлекс<sup>®</sup> хербицид

- Важна част от управлението на антирезистентността по отношение на обикновената ветрушка
- Основа за потискането на овсигата през есента
- Широк спектър на действие срещу плевели
- Идеален партньор на други продукти за растителна защита







## Отличен старт за културата още от самото начало

### АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

500 г/л бeфлyбyтaмид

### ФОРМУЛАЦИЯ

Суспензионен концентрат (СК)

### КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА

Втора професионална

### КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Обикновена ветрушка, едногодишни широколистни плевели

### ПРИЛОЖЕНИЕ

След сеитба, преди или след покълване до 3-ти лист на културата (BVCH 00-13)

### ДОЗА

50 мл/дка

### НРАС Група

F1

### КУЛТУРА

Пшеница, ечемик

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Най-добра ефикасност се постига, когато продуктът се приложи в началото на поникване на зърнените култури (BVCH 09 - 10) и в ранни етапи от развитието на плевелите.

Влажното време след приложение благоприятства трайността на действието и ефективността на продукта. Препоръчителния обем на работния разтвор е 20 - 40 л/дка, което допринася за оптимално разпределение на активното вещество върху единица площ.

Активното вещество има остатъчно почвено действие, благодарение на което продуктът остава активен до няколко седмици след приложение. Няма ограничение за следващи култури в сеитбооборота.

Чрез БеФлекс®, приложен през есента, на селското стопанство се предоставя основно средство за борба срещу ветрушката и плевелите при зимния ечемик, зимната пшеница, зимната ръж и зимното тритикале. Освен това съгласно нашия опит той има значително въздействие и върху овсигата.

### БеФлекс® - широк спектър на действие по отношение на плевелите



Средна ефективност на базата на резултати от 26 опита през 2011–2013 г. в Германия

### СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

**Контрол върху широколистни плевели:** овчарска торбичка, лечебен росопас, персийско великденче, полска теменуга, самосевка технологична и конвенционална рапица, черен синап, стъблообхватна мъртва коприна, червена мъртва коприна, полска незабравка, полски синап, попова лъжичка, полско великденче, видове здравец, видове лайка, звездица и др.

**Контрол върху житни плевели:** има доказана добра ефикасност срещу обикновена ветрушка (*Aspera spicaventi*) и потиска развитието на овсига (*Bromus spp.*) и власатка (*Vulpia spp.*).





Възможност за смесване с други хербициди за подобряване на ефикасността срещу лайка, врабови чревца и лепка

Овсигата е един задълбочаващ се проблем


С нарастване на приложението на така наречените системи за редуцирана обработка на почвата различни видове овсига се установиха в германските полета. В много региони овсигите са се разпространили до такава степен, че могат да доведат до загуба на добиви. Засега най-широко разпространена е дългоосилестата овсига, но се среща и ръжевидна овсига. По правило разпространението на овсигата започва от отвън навътре в полето, затова синорите изискват особено внимание (например мулчиране и др. подобни).

Характерни особености на най-важните видове овсига

|                | Дългоосилеста овсига                                                                         | Ръжевидна овсига                                                                                                         | Покривна овсига                                                                         | Изправена овсига                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Покълване      | През есента и пролетта                                                                       | През есента и пролетта                                                                                                   | През есента                                                                             | Предимно през пролетта                                        |
| Стъбло         | 20-100 см, голо, долните листни влагалища са къси и с меки власинки, горните обикновено голи | 20-80 см, изправено, гладко, в повечето случаи голо, листните влагалища голи, долните листни влагалища понякога овласени | 10-50 см, под възлите и съцветията-метли с меки власинки, листните влагалища неовласени | 30-100 см, листните влагалища нарядко овласени                |
| Лист           | От двете страни с меки власинки                                                              | Долната страна слабо, а горната плътно овласена                                                                          | И двете страни плътно овласени                                                          | Рядко до слабо овласени                                       |
| Езиче (лигула) | Бяло, с големина от 2 до 4 мм и дълбоко назъбено до ресничесто, ушички липсват               | Жълтеникаво, с големина от 1 до 2 мм и леко назъбено, ушички липсват                                                     | Бяло, с големина от 1 до 4 мм и фино назъбено, ушички липсват                           | Бяло, с големина от 1 до 3 мм и фино назъбено, ушички липсват |
| Растеж         | Редки туфи                                                                                   | Редки туфи                                                                                                               | Туфи                                                                                    | Туфи, понякога издънки                                        |

Действието на Бефлекс® против овсигата е потвърдено в лабораторията и на полето

При едно лабораторно изследване покълващи растения на дългоосилеста овсига (*Bromus sterilis*) бяха третирани с различни количества BeFlex®. От показаните на снимките резултати се вижда, че с нарастване на количеството на Бефлекс® (от ляво на дясно) развитието на корените се нарушава, което води до загиване на растението. В практиката освен това, интензивното развитие на културата подпомага потискането, съответно унищожаването на овсигата. Това е от значение особено при зимния ечемик, тъй като няма продукти, които да се използват за потискането ѝ през пролетта.



Развитие на корените на овсигата при прилагането на различни количества Бефлекс®





Борба с дългоосилеста овсига с 0,5 л/ха Бефлекс® + партньор


### Бефлекс®: Как да оптимизирате действието срещу видовете овсига?

Бефлекс® показва през последните две години добро базисно действие срещу видовете овсига.

За успешно потискане през есента трябва да са налице следните предпоставки:

- Възможно най-fino разрохкана пръст при засяване за стимулиране на покълването
- Влажна почва в момента на пръскането
- Прилагането трябва да съвпада с покълването на овсигата
- Прилагане на цялото количество от 50 мл/дка

### Бефлекс® – момент на прилагане при пшеница



## ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ТЦ Европа, бул. „Искърско шосе“ № 7, Сграда 7, Етаж 4, Офис 8, 1528 - София

fmcagro.bg@fmc.com | www.fmcagro.bg

Търговски представители и консултанти

области **Плевен, Ловеч, Видин, Враца, Монтана, Перник, София област**

*Маргарита Петкова*

тел.: + 359 885 049 792

*Александър Владовски*

тел.: + 359 878 625 035

области **Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Кюстендил, Благоевград, Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково**

*Десислава Георгиева*

тел.: + 359 884 952 125

*Мирослав Данаилов*

тел.: + 359 887 872 522

области **Разград, Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово**

*Здравко Чернаков*

тел.: + 359 882 445 360

области **Варна, Добрич, Силистра, Шумен**

*Мариана Иванова*

тел.: + 359 877 100 585

Търговски представител и консултант - зеленчуци, овощни и лозя

*Сейфитин Сали*

тел.: +359 893 659 263