

ОБРАЗЕЦ!

ОПАСНО!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета

EUN401: За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба!

Поискайте Информационния лист за безопасност за този продукт от Вашия дистрибутор или го изтеглете на адрес www.fmcagro.bg

Еворел® Експрес®
Evorelle® Express®

ХЕРБИЦИД ЗА УПОТРЕБА ПРИ ТОЛЕРАНТНИ НА Еворел® Експрес®
СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ХИБРИДИ

ГРУПА	2	ХЕРБИЦИД
--------------	----------	-----------------

UFI: 747X-P2MF-1N4Q-AEP1



ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H373 Може да причини увреждане на органи чрез продължителна или повтаряща се експозиция.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P260 Не вдишвайте прах.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив по кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Съберете разлятото.

P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера като опасни отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с опаковката. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продукта , близо до повърхностни води) Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или 90 % дюзи намаляващи отвяванията или 3 метра с 50 % дюзи намаляващи отвяванията до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третираня.

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ

Хербицидът Еворел® Експрес® е системен, вегетационен сулфонилуруен хербицид за контрол на широколистни плевели, в т.ч. бутрак и паламида, за употреба само при слънчогледови хибриди, толерантни на Еворел® Експрес®.

ВИД НА ПРОДУКТА

Хербицидът Еворел® Експрес® е формулиран като водоразтворими гранули (СГ).

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

Хербицидът Еворел® Експрес® съдържа 375 г/кг трибенурон метил + 125 г/кг тифенсулфурон метил.

Химично наименование на активното вещество по IUPAC

трибенурон метил

methyl-2-[[[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylamino]-carbonyl]-amino]-sulfonyl]-benzoate

тифенсулфурон метил

methyl-3-[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-amino]-carbonyl]-amino]-sulfonyl]-2-thiophenecarboxylate

Произход на активните вещества

ФМС Интернешънъл Швейцария С.А.Р.Л.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

Втора професионална - прилага се от потребители със сертификат.

КАРАНТИНЕН СРОК: Не се изисква.

ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов”- тел: 02/ 9154 233

Телефон за спешни случаи: 112

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Хербицидът Еворел® Експрес® съдържа трибенурон-метил и тифенсулфурон-метил - хербициди от групата на сулфунируреите. Те контролират плевелите, като потискат ензима ацетолактатна синтаза (ALS), който е ключов при биосинтезата на аминокиселините с разклонена верига (валин и изолевцин), участващи в изграждането на растителните протеини.

Хербицидът блокира деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните растения. Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видимите симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните плевелни видове и прерасналите плевели могат и да не загинат напълно, но те остават стопирани в своето развитие и не конкурират културата по отношение на хранителни вещества и вода. Хербицидът Еворел® Експрес® е много ефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА

ПРЗ Еворел® Експрес® е разрешен в Република България със Заповед № РД11-60/14.01.2019г. на Изпълнителния директор на БАБХ. Притежава Удостоверение за разрешаване № 01660-ПРЗ/1/23.01.2019г. Одобрен за следните употреби:

Култура	Доза	За борба срещу	Момент на приложение
слънчоглед – хибриди, толерантни на Еворел® Експрес®	4,8 – 6,0 г/дка + 0,1 % Тренд® 90	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в т.ч. свиница (<i>Xanthium strumarium</i>) и паламида (<i>Cirsium arvense</i>)	Вегетационно, в ранни фази от развитието на широколистните плевели, от 2-ри до 8-ми лист на слънчогледа (BBCH 12 - BBCH 18)

За постигане на максимален ефект, хербицид Еворел® Експрес® трябва да се прилага в ранните фази на активно растящите плевели.

По-ниската доза от 4,8 г/дка се препоръчва, когато плевелите са в начален стадий на развитие. По-високата доза от 6,0 г/дка се прилага за контрол на прераснали плевели или при силно заплевеляване със свиница (*Xanthium strumarium*) и самосевки от конвенционален слънчоглед (*Heliantus spp.*).

Прибавянето на прилепител Тренд® 90 – 0,1% към работния разтвор на хербицид Еворел® Експрес® подобрява значително хербицидният ефект на продукта, особено когато плевелите са затормозени от суша, ниски температури или друг стресов фактор, или плевели, чиято повърхност се мокри трудно поради власинки или восъчен налеп.

Максималната приложима доза на хербицид Еворел® Експрес® е 6,0 г/дка на година.

Препоръчителен обем на работния разтвор – 20 – 60 л/дка. Използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса.

Хербицидът Еворел® Експрес® не контролира самосевки от (IMI) толерантни слънчогледови хибриди или самосевки от (IMI) толерантна рапица. Препоръчително е да не се сеят Еворел® Експрес® толерантни хибриди на полета, където се очаква силно заплевеляване с такива самосевки.

Хербицидът Еворел® Експрес® е ефективен срещу най-важните широколистни плевели

Плевели, контролирани от хербицид Еворел® Експрес® (непълен списък)

Латинско име	Българско име	% Ефикасност
<i>Abutilon theophrasti</i>	Абутилон	95-100%
<i>Amaranthus spp.</i>	Видове щир	95-100%
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Обикновен щир	95-100%
<i>Artemisia vulgaris</i>	Див пелин	95-100%

<i>Brassica napus</i>	Самосевки конвенционална рапица	95-100%
<i>Chenopodium spp.</i>	Видове лобода	95-100%
<i>Datura stramonium</i>	Татул	95-100%
<i>Fumaria parviflora</i>	Дребноцветен росопас	95-100%
<i>Matricaria sp.</i>	Видове лайка	95-100%
<i>Merculialis annua</i>	Едногодишен живовляк	95-100%
<i>Papaver rhoeas</i>	Див мак	95-100%
<i>Polygonum aviculare</i>	Пача трева	95-100%
<i>Polygonum persicaria</i>	Прасковolistно пипериче	95-100%
<i>Portulaca oleracea</i>	Тученица	95-100%
<i>Sinapis arvensis</i>	Полски синап	95-100%
<i>Solanum nigrum</i>	Черно куче грозде	95-100%
<i>Xanthium strumarium</i>	Свиница	95-100%
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Амброзия	85-94.9%
<i>Chenopodium album</i>	Бяла лобода	85-94.9%
<i>Cirsium arvense</i>	Паламида	85-94.9%
<i>Hibiscus trionum</i>	Обикновено грънче	85-94.9%
<i>Anagallis arvensis</i>	Полско огнивче	70-84.9%
<i>Convolvulus arvensis</i>	Повитица	70-84.9%
<i>Fumaria officinalis</i>	Лечебен росопас	50-69.9%
<i>Polygonum convolvulus</i>	Поветицовидно фасулче	50-69.9%

Хербицидът Еворел® Експрес® трябва да се употребява само съгласно препоръките, представени в този етикет. ФМС не носи отговорност за загуби или повреди, получени в резултат на употреба на продукта, която не съответства на препоръките, посочени в този етикет. Потребителят на своя отговорност поема рисковете, свързани с нерегламентираната употреба на продукта.

Хербицидът Еворел® Експрес® е устойчив на дъжд, паднал два часа след третирането. Ако завали дъжд, преди да са изминали два часа от пръскането, ефектът от хербицида може да бъде намален. Най-подходяща фаза за третиране на широколистните плевели, в т.ч. бутрак и паламида е 2-6 лист (10 – 15 см. за паламида).

За избягване на евентуални прояви на фитотоксичност:

Хербицидът Еворел® Експрес® да се прилага, когато температурата е между 10 и 35°C. След продължителен период на застудяване (под 10°C) или продължителни валежи, трябва да се изчака слънчогледовия хибрид да се възстанови, преди да се третира с продукта.

Да не се третира с хербицид Еворел® Експрес® при температура над 35 °C и при силна слънчева светлина.

Хербицидът Еворел® Експрес® да не се прилага, ако разликата между дневната и нощната температура варира с повече от 17°C.

Хербицидът Еворел® Експрес® да не се прилага върху мокри растения (дъжд или роса).

Хербицидът Еворел® Експрес® да не се прилага най-малко до три дни след проливен дъжд, или когато почвата е залята.

Интервал, който трябва да се спазва между третирането и достъпа на хора и животни до третираната култура: Достъпът до третираните площи трябва да бъде ограничен до изсъхването на работния разтвор.

БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРАТА

Хербицидът Еворел® Експрес® е регистриран за употреба върху слънчоглед, включително сортове А.І.Р.™, които са толерантни само към хербицид Еворел® Експрес®. Преди третиране, моля консултирайте се с представител на ФМС по отношение на толерантността на съответния хибрид към хербицид Еворел® Експрес®.

Използването на други сулфонилурейни хербициди може да доведе до увреждане или унищожаване на слънчогледовите хибриди, толерантни към хербицид Еворел® Експрес®.

Да не се използва хербицид Еворел® Експрес® при друг вид слънчогледови хибриди, тъй като може да предизвика унищожаване на културното растение.

Хербицидът Еворел® Експрес® се прилага във фаза 2ри - 8ми лист на слънчогледа, приложението преди фаза 2-ри лист може да доведе до увреждане на растенията.

Да не се прилага хербицид Еворел® Експрес®, ако поникналият посев е неравен и някои растения не са навлезли в необходимата фенофаза за третиране, тъй като може да се получи фитотоксичност.

Скоро след третирането, когато има наличие на стресови фактори, може да се наблюдава временно зажълтяване на културата, което бързо се преодолява.

СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ

Различните култури реагират по различен начин спрямо ниски концентрации на хербицид Еворел® Експрес®, останали в почвата. Количеството хербицид Еворел® Експрес®, което може да остане в почвата, зависи от дозата на приложение, рН и съдържание на органична материя в почвата, изминалото след третирането време, местната земеделска практика и условията на околната среда.

Хербицидът Еворел® Експрес® се разпада много бързо в топли, кисели и микробиологично активни почви.

Пропадане на културата

В случай на пропадане на културата, третирана с хербицид Еворел® Експрес®, което изисква повторна сеитба, след едномесечен интервал на изчакване, могат да се засяват само слънчогледови хибриди, които са толерантни на хербицид Еворел® Експрес®, пролетни житни култури или царевица. Преди сеитбата, почвата трябва да се разоре и култивира, на дълбочина най-малко 15 см.

Следващи култури

През същата календарна година след прибиране на реколтата може да се сеят само зърнени култури, полски боб, лен, зимна маслодайна рапица. През пролетта на следващата година могат да се засадят грах, картофи, захарно цвекло, слънчоглед.

Поради липса на достатъчно информация, не се препоръчва засяването на зеленчуци, цветя, декоративни растения, луковичи, храсти или дървета в рамките на 16 месеца след прилагането на хербицид Еворел® Експрес®.

Контрол на самосевки от слънчогледови хибриди, толерантни на хербицид Еворел® Експрес® в житни култури

Известно е, че самосевки слънчоглед, толерантни на хербицид Еворел® Експрес® може да се появят в посевите от житни и други култури на следващата година.

В този случай се препоръчва третиране с ОМНЕРА® ОД/ ТРИОФЛЕКС™ ОД или комбинация на ХАРМОНИ® ЕКСТРА/ РЕФАЙН® ЕКСТРА с продукти на база 2,4 Д естер, МСРА, дикамба, чиято доза да бъде намалена с 50 – 60 % като намалената доза гарантира унищожаване на самосевката и 100% селективност за културата без значение от фазата на приложение, на база проведени опити в страната.

При царевица:

Продукти на база 2,4 Д, дикамба, мезотрион.

При културите соя и грах, не са известни хербициди, които ефикасно да контролират самосевки от Еворел® Експрес® толерантни слънчогледови хибриди. Затова не се препоръчва засяване на соя или грах след такива хибриди.

РЕЗИСТЕНТНОСТ

Хербицид Еворел® Експрес® съдържа активните съставки трибенурон-метил и тифенсулфурон-метил, и двете принадлежащи към групата на сулфониуреите. Когато хербициди с един и същ начин на действие се използват многократно в продължение на няколко години на едно и също поле, това може да доведе до появата на устойчиви видове плевели. Тези видове могат да се разпространят и да се превърнат в доминиращи. За устойчиви видове се приемат тези плевели, които не могат да бъдат контролирани при спазване на препоръките за употреба на продукта и препоръчителната доза. Развитието на устойчивост при плевелите може да се избегне или забави чрез редуване (или смесване) с подходящи продукти, които имат различен начин на действие. Трябва да се приеме стратегия за предотвратяване и управление на резистентността.

Знае се, че зимните зърнено-житни култури и зимната маслодайна рапица са типични култури, включени в сеитбооборота след отглеждане на слънчоглед. За да се предотврати или намали рискът от поява на резистентност, се препоръчва използването, при житни култури, по отделно или в резервоарни смеси на хербициди на база бромоксинил, дифлуфеникан, изопротурон, които биха намалили наличието на тези плевели. При слънчоглед се препоръчва след третиране с хербицид Еворел® Експрес® да се използва друг продукт на база s-метолахлор, флуорохлоридон или аклонифен.

СМЕСИМОСТ

Хербицидът Еворел® Експрес® е физически съвместим с редица продукти за растителна защита.

При смесването на хербицид Еворел® Експрес® с фунгициди, инсектициди или торове, задължително да се спазват инструкциите, посочени в техния етикет.

Когато хербицид Еворел® Експрес® се прилага с течни азотни торове, към разтвора Не трябва да се добавя прилепител.

Хербицидът Еворел® Експрес® не трябва да се смесва с противожитни вегетационни хербициди, тъй като може да доведе до поява на фитотоксичност при хибридите толерантни на хербицид Еворел® Експрес® и/или намалена ефикасност.

За контрол на житни плевели е препоръчително да се спазва 7 дневен интервал между третирането с хербицид Еворел® Експрес® и това с противожитен хербицид.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Убедете се, че пръскачката е чиста и в добро работно състояние. Цялото оборудване за пръскане трябва да бъде почистено преди и след приложение на хербицид Еворел® Експрес®.

Калибрирайте пръскачката, за да се постигне пълно покритие на плевелната листна маса.

1. Напълнете наполовина резервоара с вода и пуснете бъркалката.
2. Прибавете необходимото количество в резервоара. Гранулите се разтварят за няколко минути във водата.
3. При измерването на продукта използвайте специалната мерителна чашка.
4. Продължете бъркането, докато пълните резервоара догоре с вода.
5. Оставете бъркалката включена през цялото време на пръскането.
6. Ако прибавяте друг продукт като резервоарна смес, моля следвайте препоръчителната поредност за добавяне на продукти в резервоара посочена в т. Последователност при резервоарни смеси.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ РЕЗЕРВОАРНИ СМЕСИ

Добавете различни типове формулации в последователността, посочена по-долу. Оставете време за пълно смесване и разтваряне след прибавяне на всеки продукт.

1. Водоразтворима торба (WSB)
2. Водоразтворими гранули (SG)
3. Вододиспергируеми гранули (WG)
4. Умокрям прах (WP)
5. Суспензионен концентрат (SC)
6. Капсулна суспензия (CS)
7. Суспо-емулсия (SE)
8. Маслена дисперсия (OD)
9. Емулсия, масло във вода (EW)
10. Емулгируем концентрат (EC)
11. Адюванти, повърхностноактивни вещества, масла
12. Разтворими торове
13. Препарати, намаляващи отвяването на работния разтвор.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЪСКАЧКАТА

Вземете всички необходими предпазни мерки при почистване на оборудването.

ПРЪСКАЧКАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧИСТВА В БЛИЗОСТ ДО КЛАДЕНЦИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИЛИ ДО ДРУГИ КУЛТУРНИ РАСТЕНИЯ.

След края на прилагането, старателно изплакнете пръскачките и маркучите, шангите, филтрите и дюзите с чиста вода, за да намалите риска от образуване на отлагания, които трудно могат да се отстранят.

Почистете всяко съпътстващо оборудване. Изпразнете резервоара. Водата от плакненето трябва да се третира според местните разпоредби.

За да се избегне повреждането на други култури, пръскачната техника трябва да бъде измита много добре веднага след третирането с хербицид Еворел® Експрес®.

След третиране с хербицид Еворел® Експрес® самостоятелно, почистването може да се направи само с вода, следвайки следните инструкции:

1. След като приключите с пръскането, изпразнете напълно резервоара.
2. Изплакнете обилно резервоара (включително капака) с чиста вода (използвайте поне 10% от капацитета на резервоара). Внимателно премахнете всички видими отлагания.
3. Почистете помпата, филтрите, и шангите, отделно извадете и почистете с вода маркучите, дюзите и друго оборудване, което може да бъде разглобено.
4. Повторете стъпка 2 и източете резервоара

Отпадната водата може да се напръска върху културата, която е била третирана.

Не забравяйте да почистите пръскачката отвън.

По време на почистването трябва да се вземат всички необходими мерки за безопасност.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ

!Да не се дава нищо през устата на лице в безсъзнание!

1. **При контакт с кожата:** Замърсеното облекло и обувки да се свалят. Измийте тялото незабавно със сапун и много вода. Ако дразненето на кожата продължи или при алергия, повикайте лекар. Облеклото да се почисти преди повторна употреба.
2. **При попадане в очите:** Незабавно промийте окото/очите обилно с вода, като свалите контактните лещи. При промиването отваряйте широко очите. Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.
3. **При вдишване:** Пострадалият да се премести на чист въздух. Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ. Пострадалият да бъде под постоянно наблюдение.
4. **При поглъщане:** Не предизвиквайте повръщане без консултация с лекар. Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода. Освободете дихателните пътища. Не давайте мляко или алкохолни напитки. Повикайте лекар.

Лечение: Лекувайте симптоматично. В случай на поглъщане е необходима незабавна медицинска помощ.

ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО И ХИГИЕННИ МЕРКИ

- Носете лично предпазно облекло – маска, очила и ръкавици.
- Избягвайте контакт с продукта.
- Неправилната употреба може да увреди Вашето здраве.
- Не вдишвайте прах/мъглата от работния разтвор.
- Пазете далече от достъп на деца.
- Избягвайте попадане на разтвор по кожата и очите.
- Не яжте, не пийте и не пушете по време на пръскането.

СЪХРАНЕНИЕ

- Хербицидът Еворел® Експрес® се съхранява в оригинална опаковка, на сухо и добре проветриво място, при умерена температура и не изложен на пряка слънчева светлина.
- Да се съхранява на места с ограничен достъп. Да се пази далече от деца.
- Да се пази далече от храна, вода и животинска храна.

РАБОТА С ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

- Използвайте хербицид Еворел® Експрес® съгласно препоръките в етикета.

- При работа с продукта, носете лично предпазно облекло.
- Да се следват общите препоръки за безопасна работа с продукти за растителна защита.
- Използвайте само чисто оборудване.
- Не вдишвайте изпаренията или мъглата/прах, която се образува по време на пръскането.
- На местата, в които е възможно образуване на прах, да се осигури подходяща вентилация
- При приготвяне на работния разтвор, следвайте посочените в този етикет инструкции.
- Измивайте ръцете преди почивките и веднага след приключване на работа с продукта.
- Съблечете и почистете замърсеното облекло преди повторна употреба.

ТРАНСПОРТИРАНЕ

Съгласно разпоредбите за транспорт на химически вещества. Да се следват инструкциите в информационния лист за безопасност.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР

Подходящи средства при пожар: водна струя, обикновена пяна, сух химикал, въглероден двуокис. Да не се ползва силна водна струя (риск от замърсяване). Пожарникарите трябва да носят предпазни дихателни апарати ако е необходимо.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИ ОПАКОВКИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДУКТА

Изпразнете напълно опаковката в пръскачката. Изплакнете я с вода и добавете тази вода в резервоара на пръскачката. Да не се използват празните опаковки за други цели. Да се унищожават според местните разпоредби. Да не се допуска замърсяване на водни източници и канавки.

ФМС Агро България ЕООД участва в програма за събиране на опаковки от продукти за растителна защита. Услугата по събиране на празните опаковки от ПРЗ е безплатна и се прилага само за пластмасови опаковки от ПРЗ. Основното изискване е да се прилага трикратно изплакване на празните опаковки, като се следват следните стъпки:

1. Напълнете 1/3 от обема на празната пластмасова опаковка с чиста вода.
2. Поставете обратно капачката и силно разклатете за 30 сек, за да изплакнете опаковката отвътре.
3. Излейте водата от изплакването в резервоара на пръскачката, като задържите за 30 сек, за да се отцеди добре.
4. Повторете поне още 2 пъти.

Капачките се събират отделно от опаковките!

Извозването на празните опаковки от ПРЗ се извършва от фирма „Скалар Еко“ ЕООД, тел. 082 840 279, 0876 208 860, 0877 511 471.

ДРУГИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специално внимание трябва да се обръща, за да се избягва отвяването на работен разтвор извън мястото на приложение, както и отвяването му върху канали, язовири и други водни източници. Използването на по-големи капки при пръскане намалява потенциала за отвяване на работния разтвор. При неправилно приложение или при неблагоприятни климатични условия обаче, риска от отвяване е голям, дори и ако се използват по-големи капки при пръскане. Използването на оборудване за пръскане, подходящо за предвидената употреба е отговорност на оператора. Пръскачната техника трябва да е пригодена така, че да не се допуска отвяването на работния разтвор при пръскане.

Когато се пръска до близо разположени, чувствителни култури, трябва да се направи всичко възможно, за да се избегне отвяването на работен разтвор към тях. Също така да се избягва отвяването на разтвор и към площи, които ще бъдат скоро засети. Да не се пръска, когато скоростта на вятъра е по-голяма от 15 км/ч. Високата температура, сушата и ниската въздушна

влажност увеличават риска от отвяване на разтвора. Да не се третира, когато има температурна инверсия, характеризираща се с липса на въздушно течение и увеличаване на температурата с увеличаване на надморската височина.

Да се избягва пръскане или работа с продукта на дистанция по – малка от 15 м от водни източници или канализационна система или места, където има вероятност оттичащата се дъждовна вода да се влее във водоизточници. Да не се пръска на разстояние по- малко от 20 м. от естествени или изкуствени водни площи.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ

В случай на инцидентно разливане на продукта следвайте следните инструкции:

1. Избягвайте контакт с продукта. Не поглъщайте.
2. Дръжте далеч от източници на възпламеняване. Да не се пуши.
3. Използвайте лично предпазно облекло (например защитни ръкавици, очила).
4. Избягвайте отмиване на продукта. Използвайте абсорбиращ материал или съберете разсипаното количество посредством вакуум.
5. Не допускайте изтичане в канализацията.
6. Почистете мястото на разливането и оборудването с влажен парцал.
7. Поставете абсорбиращите / почистващи материали и замърсените опаковки в заключващ се контейнер.
8. Измийте внимателно след работа.
9. Свържете се с производителя за съвет.
10. Изхвърлете отпадъците безопасно в съответствие с местните разпоредби.

ЕКОТОКСИЧНОСТ

Продуктът е силно токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни последици във водната среда. Да се вземат предпазни мерки, за да не попадне продукта или празни опаковки от него във водоизточници или отточни води.

ОПАКОВКА

150 гр. продукт в пластмасова бутилка HDPE.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: виж опаковката

Партиден №: виж опаковката

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години от датата на производство

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ФМС Интернешънъл Швейцария С.А.Р.Л.

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА:

ФМС Агро България ЕООД, София 1528, бул. „Искърско шосе“ № 7, ТЦ „Европа“, Сграда 7, Етаж 4, Офис 8, тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44, www.fmcagro.bg

ОТКАЗ ОТ ПРАВА

ФМС гарантира съответствието на продукта с описанието, представено в етикета, при условие, че продукта е в запечатана, оригинална опаковка, с холограмен знак.

ФМС гарантира високото качество на продукта, който трябва да се прилага съгласно подробните инструкции върху етикета.

Компанията не носи отговорност за всякакви директни или индиректни последствия, произтичащи от неправилно съхранение, употреба, или погрешно използване на продукта. Компанията не може да носи отговорност за недостатъчно доброто представяне на продукта, дължащо се на стресови за културата фактори, почвени, сортови, климатични особености и др.

FMC, логото на FMC, Evorelle Express, Еворел Експрес и Тренд са търговски марки на FMC Corporation и/или нейните филиали. ©2019-2024 FMC Corporation. Всички права запазени.

