



An Agricultural
Sciences Company



ГРИЖАТА Е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ

Цервента™

хербицид

**Ново решение за отличен контрол на широколистни плевели
при зимни и пролетни житни култури**

**ИНФОРМАЦИЯТА В ТАЗИ БРОШУРА Е САМО ЗА СПРАВКА! ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В НЕГО!**



An Agricultural
Sciences Company

Цервента™
хербицид

Цервента™ - хербицид

Ново решение за отличен контрол на широк спектър широколистни плевели при зимни и пролетни житни култури

ПШЕНИЦА - ЕЧЕМИК - ОВЕС - РЪЖ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО	83 г/кг трибенурон-метил; 83 г/кг метсулфурон-метил; 105 г/кг флорасулам
ФОРМУЛАЦИЯ	Вододиспергируеми гранули (ВГ)
КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА	Втора професионална
ОПАКОВКА	250 г
НРАС Група	2

КУЛТУРА	КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ	ДОЗА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАР. СРОК
Пшеница, ечемик, овес, ръж	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	3,5 - 5 г/дка	от братене до пълна поява на флагов лист (BBCH 20 - 39)	няма

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:


За постигане на максимален ефект, **хербицидът Цервента™** трябва да се прилага в ранни фази на активно растящите плевели.

Препоръчителен обем на работния разтвор – 10 – 40 л/дка. В зависимост от плевелното покритие и вида на плевелите, използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса.

При голяма плътност на плевелите, при прерастнали такива или при наличие на плевели с восъчен налеп или власинки, се препоръчва добавянето на прилепител **Тренд® 90**.

* За контрол на лепка, дозата 3,5 г/дка може да се използва само при малки растения и при ниска до умерена плътност на плевела

Приложение на хербицид Цервента
3,5 – 5 г/дка
(BBCH 20-39)





An Agricultural
Sciences Company

Цервента™ хербицид

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

Цервента™ е системен селективен хербицид, комбиниращ три активни съставки, който се поема от листата и корените и се придвижва към вегетационните върхове на плевелите, скоро след прилагането му. Действието му се основава на потискането на ензима ацетолактатна синтеза (ALS). Този ензим е ключов за синтеза на аминокиселини, необходими за растежа на растенията.


В чувствителните плевели деленето на клетките спира часове след прилагането на продукта, което предизвиква незабавно спиране на растежа. Видимите симптоми (промяна в цвета на плевелите, избеляване, некроза) се наблюдават до 1-2 седмици след третирането, което зависи и от условията на растеж и чувствителността на плевелите. По-малко чувствителните и по-големи плевели може да не бъдат унищожени напълно, но остават потиснати в своето развитие и не конкурират културата



Контрола



Цервента™





An Agricultural
Sciences Company

Цервента™ хербицид

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Хербицидът **Цервента™** е ефективен срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели като врабчови чревца, мак, мъртва коприва, обикновен спореж, овчарска торбичка, петниста бударица, повитицовидно фасуличе, подрумче, полска незабравка, попова лъжичка, прасковелистно пипериче, ралица, синап, бяла лобода, венерин гребен, войничница, див коноп, видове здравец, къклица, галинзога и др.



лепка



пача
трева



полска
паламида




лайка

Хербицидът **Цервента™** предлага висока ефикасност и надеждност при голям брой плевели, включително някои трудни за контрол видове като **лепка** (*Galium aparinae*), **лайка** (*Matricaria chamomilla*), **полска паламида** (*Cirsium arvense*) и **пача трева** (*Polygonum aviculare*).

Цервента™ - 5 г/дка

Конкурентен продукт - 100 мл/дка





An Agricultural
Sciences Company

Цервента™ хербицид

КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ

В долната таблица е представен непълен списък на плевелите, контролирани от хербицид Цервента™, според тяхната чувствителност и според дозата на третиране:

Едногодишни и многогодишни плевели (които са на полето към момента на третирането)		Ефикасност при 5 г/дка	Ефикасност при 3,5 г/дка
	Врабчови чревца (<i>Stellaria media</i>)	СЧ	СЧ
	Галинзога, влакнеста (<i>Galinsoga quadriradiata</i>)	СЧ	СЧ
	Лайка, видове (<i>Matricaria spp.</i>)	СЧ	СЧ
	Лепка (<i>Galium aparinae</i>)*	СЧ	Ч
	Лечебна мъдрица (<i>Sisymbrium officinale</i>)	СЧ	СЧ
	Полски мак (<i>Papaver rhoas</i>)	СЧ	Ч
	Мъртва коприва (<i>Lamium spp.</i>)	СЧ	СЧ
	Обикновен спореж (<i>Senecio vulgaris</i>)	СЧ	СЧ
	Овчарска торбичка (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	СЧ	СЧ



An Agricultural
Sciences Company

Цервента™ хербицид

КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ

Едногодишни и многогодишни плевели (които са на полето към момента на третирането)		Ефикасност при 5 г/дка	Ефикасност при 3,5 г/дка
	Петниста бударица (<i>Galeopsis tetrahit</i>)	СЧ	СЧ
	Повитицовидно фасулче (<i>Polygonum convolvulus</i>)	СЧ	Ч
	Подрумче, видове (<i>Anthemis spp.</i>)	СЧ	СЧ
	Полска незабравка (<i>Myosotis arvensis</i>)	СЧ	Ч
	Попова лъжичка (<i>Thlaspi arvense</i>)	СЧ	СЧ
	Самосевка рапица (<i>Brassica napus</i>)	СЧ	СЧ
	Полски синап (<i>Sinapis arvensis</i>)	СЧ	СЧ
	Дива ряпа (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	СЧ	СЧ
	Прасковолистно пипериче (<i>Polygonum persicaria</i>)	СЧ	Ч

СЧ – силно чувствителен плевел (Ефикасност > 95%)

Ч – чувствителен плевел (Ефикасност 85 – 94.9 %)

УЧ – умерено чувствителен плевел (Ефикасност 70 – 84.9%)

У – устойчиви плевели (Ефикасност 50 – 69.9%)



An Agricultural
Sciences Company

Цервента™ хербицид

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ЦЕРВЕНТА™:

Гъвкавост на използване

- ✓ Етап от развитието на културата от трети лист до пълна поява на флагов лист
- ✓ Удобна и лесна за използване формулация
- ✓ Гъвкава доза от 3,5 до 5 г/дка
- ✓ Добра адаптивност към различни климатични условия



Селективност

- ✓ Грижа към културата и спомагане нормалното развитие

Тройна активна съставка

- ✓ Утроена мощност с едно приложение, благодарение на трите активни вещества трибенурон-метил, метсулфурон-метил и флорасулам



Рентабилност

- ✓ Положителен принос за по-добро качество и по-голямо количество на реколтата

Цервента™

Надеждност

- ✓ Хомогенни резултати и равномерна ефикасност
- ✓ Отличен контрол



Контрол на плевелите

- ✓ Контрол на упоритите плевели лайка, лепка, полска паламида, теснолистно пиперче
- ✓ Спиране на растежа до часове
- ✓ Устойчиво решение, което отговаря на нуждите на производителя



Търговски представители и консултанти по региони в България:

**области Плевен, Ловеч, Видин, Враца,
Монтана, Перник, София област**

Маргарита Петкова
тел.: + 359 885 049 792

Александър Владовски
тел.: +359 878 625 035

**области Разград, Русе, Търговище,
Велико Търново, Габрово**

Здравко Чернаков
тел.: + 359 882 445 360

**области Варна, Добрич, Силистра,
Шумен**

Мариана Иванова
тел.: + 359 877 100 585

**области Пловдив, Пазарджик,
Стара Загора, Смолян, Кърджали,
Кюстендил, Благоевград**

Десислава Георгиева
тел.: + 359 884 952 125

**области Сливен, Бургас, Ямбол,
Хасково**

Мирослав Данаилов
тел.: +359 887 872 522

**Търговски представител и консултант –
зеленчуци, овощни и лозя**

Сейфитин Сали
тел.: +359 893 659 263

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ТЦ Европа,
бул. „Искърско шосе“ № 7, Сграда 7,
Етаж 4, Офис 8 | 1528 - София
тел. 02 818 56 56
fmcagro.bg@fmc.com
www.fmcagro.bg