

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широк спектър от гризещи и смучещи неприятели

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО	200 г/л циантранилипрол (Циазипир®)
ФОРМУЛАЦИЯ	СК (суспензионен концентрат)
КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА	Непрофесионална
ОПАКОВКА	100 мл
НРАС Група	28

ПРИЛОЖЕНИЕ

КУЛТУРА	НЕПРИЯТЕЛИ	ДОЗА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАР СРОК
Домати, патладжани, пипер, тиквови култури (тикви, краставици, тиквички, корнишон, пъпеши, дини) - оранжерийно производство	Доматен миниращ молец Тютюнева и Оранжерийна белокрылка, Сребристо точкова, Памукова, Египетска памукова и Малка полска нощенка Памукова листна въшка Трипс, Миниращи мухи	37.5 - 50 мл/дка капково напояване	ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен - пълна зрялост)	1 ден

КУЛТУРА	НЕПРИЯТЕЛИ	ДОЗА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАР СРОК
Ягоди - оранжерийно производство	Памукова, Египетска памукова и Малка полска ноценка, Трипс	37.5 мл/дка капково напояване	ВВСН 12-89 (втори лист развит - втора реколта)	1 ден
Зелен фасул - оранжерийно производство	Тютюнева и Оранжерийна белокрылка, Трипс, Памукова ноценка Памукова листна въшка Миниращи мухи	37.5 - 50 мл/дка капково напояване	ВВСН 12-89 (2 развити листа - пълно узряване)	1 ден
Марули - оранжерийно производство	Памукова ноценка Египетска памукова ноценка, Трипс	37.5 - 50 мл/дка капково напояване	ВВСН 12-89 (разтворен 2 същински лист - пълно узряване)	1 ден

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ

КУЛТУРА	НЕПРИЯТЕЛИ	ДОЗА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАР СРОК
Салатни растения, листни зеленчуци - оранжерийно производство	Видове ноценки	37.5 - 50 мл/дка капково напояване	В началните етапи на нападение, от яйцеснасяне до излюпване на първи ларви - ВВСН 12-89 за културата	1 ден
Ягоди - оранжерийно производство	Зелена прасковена листна въшка Ягодово хоботниче	37.5 мл/дка капково напояване	ВВСН 12-89 за културата	1 ден

ПРЕПОРЪКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Инсектицидът Веримарк® 200 СК е специално формулиран, за да се **прилага чрез системата за капково напояване**, като се внася с поливната вода в първата третина от цикъла на напояване. Целта на внасянето на инсектицид чрез капково напояване е да се постигне равномерна и бърза защита чрез най-оптималното му усвояване от корените и разпределяне на продукта в цялото растение. Препоръчва се прилагане в началните етапи от развитието на културата, при което се осигурява силен старт на културата, като контролира неприятелите и предотвратява повреди, предизвикани от храненето, и създава възможности за подобряване на добива.

- **Приложение при домати, патладжани, пипер, тиквови култури (краставици, тиквички, корнишон, тикви, пъпеши, дини), ягоди - отглеждани в оранжерии:** Максимален брой приложения на година - 4 с минимален интервал между приложенията - 7 дни.
- **Приложение при зелен фасул - оранжерийно производство:** Максимален брой приложения на година - 2 с минимален интервал между приложенията - 7 дни.
- **Приложение при марули - оранжерийно производство:** Максимален брой приложения на година - 3 с

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Инсектицидът Веримарк® 200 СК действа предимно стомашно, но притежава и контактно действие. След поемането на токсичната доза, поведението на насекомото бързо се променя, което се проявява в спиране на храненето, с последваща смърт в рамките на 3 до 6 дни. Инсектицидът Веримарк® 200 СК действа основно срещу яйцата, ларвите, а при някои неприятели и срещу възрастните индивиди. Активното вещество циантранилипрол (Суазуруг®) притежава системно действие, като се придвижва акропетално по ксилема т.е. от корените към надземните вегетативни части на растението. Всичко това обуславя отличното действие на активното вещество, както върху гризещите, така и върху смучещите насекоми.



ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД
ТЦ Европа, бул. „Искърско шосе“ № 7,
Сграда 7, Етаж 4, Офис 8 | 1528 - София
тел. 02 818 56 56
fmcagro.bg@fmc.com
<https://ag.fmc.com/bg>

Търговски мениджър за Южна България и области Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Кюстендил, Благоевград
Десислава Георгиева
тел.: +359 884 952 125

Търговски мениджър за Северна България и области Разград, Русе, Търговище
Здравко Чернаков
тел.: +359 882 445 360

Търговски представител и консултант зеленчуци, овошни и лозя
Сейфо Сали
тел.: +359 893 659 263

области Видин, Враца, Монтана, Перник, София област
Венсан Йорданов
тел.: + 359 877 434 244

области Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново
Александър Владовски
тел.: +359 878 625 035
Христо Христов
тел.: + 359 896 135 233

области Варна, Добрич, Силистра, Шумен
Мариана Иванова
тел.: +359 877 100 585

области Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково
Мирослав Данаилов
тел.: +359 887 872 522

ОТЛИЧНА СЪВМЕСТИМОСТ С ПРОГРАМИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНА БОРБА С НЕПРЯТЕЛИТЕ

Инсектицидът Веримарк® 200 СК има отличен токсикологичен и екотоксикологичен профил. Той показва много ниска токсичност към бозайниците във всички проведени проучвания, което позволява установяването на кратки интервали за прибиране на реколтата след приложението на продукта. Когато инсектицидът Веримарк® 200 СК се прилага върху почвата, той се придвижва системно в растението, като селективно въздейства на вредителите, които се хранят с растителните тъкани. Намалената експозиция и ниската токсичност за полезните членестоноги помагат да се увеличи максимално ефективността на хищниците и паразитоидите. Тези характеристики правят от инсектицида Веримарк® 200 СК идеалният избор за програмите по интегрирано управление на неприятелите.



СИГУРНА ЗАЩИТА В НАЙ-РАННИТЕ ЕТАПИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА

Намаляването на стреса, на който са подложени растенията в началото на вегетативния цикъл, води до по-енергичния им растеж и силния старт в развитието им.



Инсектицид Веримарк® 200 СК, капково напояване, 34 дни след разсаждане



Нетретираны растения, нападнати от Т. белокрылка и Памукова листна въшка, 34 дни след разсаждане

Защитата на краставици чрез капково приложение на инсектицида Веримарк® 200 СК ясно води до по-силен и по-устойчив растеж на културата.

ВЕРИМАРК® 200 СК ОСИГУРЯВА БЪРЗО СПИРАНЕ НА ХРАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ НЕПРЯТЕЛИ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ

В рамките на 49 минути след приложението на инсектицида Веримарк® 200 СК върху доматени растения 90% от индивидите от вида *Spodoptera exigua* спират да се хранят с листата им. Растенията получават бърза защита срещу повреди, независимо от това, че неприятелите все още могат да продължат да изглеждат активни.

ИНСЕКТИЦИД ВЕРИМАРК® 200 СК Е РАЗРАБОТЕН ЗА ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Инсектицидът Веримарк® 200 СК е с формулация на водна основа, оптимизирана за **почвени приложения**, която осигурява постоянно възходящо придвижване от корена към стъблото с отлични граници на безопасност за културите – дори и за неукрепналите разсади. Когато се прилага в зоната на корените, Веримарк® 200 СК се абсорбира лесно и се разпределя в растението, осигурявайки постоянна и бърза защита на културите. Веримарк® 200 СК **не е подходящ за листно третиране**.

Веримарк® 200 СК подобрява вкореняването и жизнеността на културите след разсаждане, като контролира широк спектър от неприятели, нападащи младите растения, включително белокрылки, листни въшки, трипси, миниращи молци, хоботници и нощенки.

ИНСЕКТИЦИДЪТ ВЕРИМАРК® 200 СК ПОДОБРЯВА СТАРТА НА КУЛТУРАТА ЗА ПО-РАННО УЗРЯВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ



Стандартна програма за отглеждане



Програма с приложение на инсектицид Веримарк® 200 СК

ИНСЕКТИЦИД ВЕРИМАРК® 200 СК С АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО CYAZYPYR®

Инсектицидът Веримарк® 200 СК съдържа активното вещество циантранилипрол, второто активно вещество от химическия клас на антранил диамидите и първото, което контролира както гризещи, така и смучещи неприятели. Инсектицидът Веримарк® 200 СК е разработен за оптимизирано усвояване от корените на растенията и за осигуряване на защитата им в **началото на развитието на културата**. Когато се прилага върху кореновата зона преди, по време или скоро след сеитбата или разсаждането, инсектицидът Веримарк® 200 СК предотвратява храненето на неприятелите с растенията, като по този начин намалява както преките щети, така и предаването на някои вируси, пренасяни от насекоми.

ЗАЩИТА ОТ УВРЕЖДЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ХРАНЕТО НА ЛИСТОМИНИРАЩИ МОЛЦИ ВЪРХУ БОБОВИ РАСТЕНИЯ



Нетретирано растение



Растение, третирано с инсектицид Веримарк® 200 СК

ЗАЩИТАТА В НАЧАЛОТО ОПРЕДЕЛЯ ФИНАЛА

Веримарк® 200 СК
инсектицид

Информацията в тази брошура е само за справка. Преди употреба прочетете етикета на всеки продукт и спазвайте указанията написани в него. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита!