

Azugro®



HERBICIDA

powered by

ISOFLEX® active



Innovación que se ve.

**Nuevo modo de acción
para el control de ballicas
en trigo y avena.**

Azugro®



HERBICIDA

powered by
ISOFLEX® active



- **Herbicida preemergente de largo efecto residual.**
- **Nuevo grupo químico para trigo y avena: Clasificación HRAC Grupo 13 (Isoxazolidinonas).**
- **Ingrediente activo: Isoflex® active (Bixlozone).**
- **Formulación SC (suspensión concentrada).**
- **Modo de acción: bloqueo de la biosíntesis de carotenoides, lo que interfiere con la fotosíntesis y finalmente conduce a la muerte de las malezas objetivo.**
- **Se aplica al suelo, donde es absorbido por las raíces y brotes de las semillas de las malezas en germinación y luego es transportado a través del tejido xilemático, mediante la corriente de transpiración de las malezas.**



Azugro®



HERBICIDA

powered by
ISOFLEX® active



- Las plántulas de malezas susceptibles que han absorbido Azugro comúnmente emergen con un aspecto clorótico, decolorado y/o morado (Efecto magenta). Luego se secan rápidamente en unas pocas semanas cuando se agota la reserva de energía de la semilla.
- Control preemergente de ballica, cola de zorro, sanguinaria, manzanillón, diente de león, pasto pinito y calabacillo en trigo y avena.
- Controla ballicas incluyendo las resistentes a EPSPs, ACCasa y ALS.
- Compatible con la mayoría de los herbicidas de uso común en trigo y avena.
- No aplicar sobre siembras muy superficiales ni irregularmente cubiertas.
- Evitar aplicación Azugro cuando existan pronósticos de lluvias mayores a 40mm durante los 3 días posteriores a su aplicación.
- Evitar aplicar en suelos con mal drenaje o con alta retención de humedad (Anegamiento).
- Evitar aplicar el producto en cultivos bajo riego por tendido o inundación.



Instrucciones de uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ Ha)	Observaciones
Trigo	Hierbas o gramíneas: Ballica <i>(Lolium multiflorum),</i> Cola de Zorro <i>(Cynosurus echinatus)</i> Hoja ancha: Sanguinaria <i>(Polygonum aviculare),</i> Manzanillón <i>(Anthemis cotula),</i> Diente de León <i>(Taraxacum officinale),</i> Pasto pinito <i>(Spergula arvensis),</i> Calabacillo <i>(Silene gallica),</i> Mostacilla <i>(Sisymbrium officinale).</i>	1-1,2 (*)(**)	Realizar 1 aplicación post siembra de cultivos y en preemergencia de las malezas y del cultivo (no aplicar con el cultivo emergiendo). Es necesario remover la cobertura vegetal presente antes de realizar la aplicación, en caso de que las malezas ya hayan emergido. Utilizar volúmenes de aplicación entre 100 y 200 L/ha. La semilla deberá quedar ubicada a una profundidad mínima de 2.5 cm y asegurar una buena cobertura de suelo sobre ella.
Avena		1-1,2 (**)	Realizar 1 aplicación post siembra de cultivos y en preemergencia de las malezas y del cultivo (no aplicar con el cultivo emergiendo). Es necesario remover la cobertura vegetal presente antes de realizar la aplicación, en caso de que las malezas ya hayan emergido. Utilizar volúmenes de aplicación entre 100 y 200 L/ha. La semilla deberá quedar ubicada a una profundidad mínima de 3,0 cm y asegurar una buena cobertura de suelo sobre ella.

(*) Usar la dosis más alta en sectores con alta presión de malezas.

(**) En caso de variedades más sensibles a la aplicación de Azugro, utilizar una dosis máxima de 1L. Antes de aplicar, consultar a departamento técnico de FMC por información de variedades sensibles.

Azugro®



HERBICIDA

powered by
ISOFLEX® active

FMC | An Agricultural
Sciences Company

📷 FMC_Chile in FMC Chile 🌐 ag.fmc.com/cl

ATENCIÓN Lea atentamente y siga rigurosamente las instrucciones contenidas en la etiqueta.
Recuerde depositar los envases con triple lavado e inutilizados en centros de acopio.

