270 mm
130 mm

FMC

FURAVIA®

Bioestimulante Biológico

Suspensión concentrada (SC)
***Bacillus paralicheniformis* RTI184: 3.85x10⁹ CFU/mL mínimo**
pH: 5.5 - 8.5
densidad: 1.16 g/ mL

Metales pesados:	mg/ kg
Cromo hexavalente (Cr VI)	<0,50 ppm
Cadmio (Cd)	<0,50 ppm
Arsénico (As)	<2,0 ppm
Plomo (Pb)	<2,0 ppm
Mercurio (Hg)	<2,0 ppm
Níquel (Ni)	<2,50 ppm

Análisis microbiológico	Resultado
Recuento de Escherichia coli	<1000 UFC/g (Ausente)
Investigación de Salmonella spp	Ausencia en 25g

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

FABRICADO Y FORMULADO POR:
Cheminova Deutschland GmbH & CO. KG
Stader Elbstrabe 28 - 21683 - Stade Germany

Althaller Italia s.r.l.
Strada Comunale per Campagna, 5
20078 S. Colombano al Lambro (MI), Italy

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
FMC QUIMICA CHILE LTDA.
Av. Vitacura 2670, piso 15,
Las Condes, Santiago

FMC

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

NÚMERO DE LOTE: ver envase
FECHA DE FORMULACIÓN: ver envase
FECHA DE VENCIMIENTO: ver envase

FMC, el logotipo de FMC y Furavia son marcas comerciales de FMC Corporation y/o una afiliada. ©2023 Corporación FMC. Reservados todos los derechos.

FURAVIA® es un bioestimulante biologico, que puede utilizarse vía riego por goteo en los cultivos indicados en las instrucciones de uso de esta etiqueta. El bioestimulante biologico FURAVIA® contiene esporas vivas de *Bacillus paralicheniformis* (RTI184). El *Bacillus paralicheniformis* (RTI184) se extrae de las raíces del arroz cultivado en California, siendo una cepa natural de bacterias no modificadas genéticamente. Las esporas del bioestimulante biologico FURAVIA® germinan en las raíces de las plantas en crecimiento, y las células vegetativas nacientes de la bacteria colonizarán posteriormente las raíces, dando lugar a la formación de biopelículas. Se sabe que *Bacillus paralicheniformis* desempeña un papel importante en la rizosfera de las plantas. La combinación del organismo y la planta mejora el desarrollo de las raíces de las plantas, e incrementa la vitalidad y biomasa de las mismas. El producto también protege al cultivo del estrés abiótico, como la sequía o el estrés por herbicidas. En etapas posteriores, estos efectos quedarán patentes a través de mayores rendimientos. La fisiología de las plantas y los estudios genéticos han demostrado que estos efectos se basan en la producción bacteriana y la liberación de moléculas hormonales, que estimulan la salud y el crecimiento de las plantas. Además, *Bacillus paralicheniformis* (RTI184) posee genes que permiten a la planta una mayor captación de nutrientes del suelo.

Instrucciones de uso

Cultivos	Método de aplicación	Dosis (L/ha)	Carencia (Días)
Melón, Sandía, Pepino, Zapallo, Zapallo Italiano, Tomate, Berenjena, Pimiento, Lechuga, Repollo, Coliflor, Brócoli, Frutilla.	Riego por goteo	0.5	0
Momento de Aplicación: Primera aplicación: 0-6 días después de la siembra Segunda Aplicación: 2-4 semanas después de la primera aplicación.			
Cultivos	**Método de aplicación**	**Dosis (L/ha)**	**Carencia (Días)**
Avellano Europeo, Carozos (Cerezos, Duraznero, Nectarines, Plumcot, Ciruelos y Damascos), Berries (Arándano, Frutilla, Mora, Frambuesa, Cranberries), Nogales, Manzana, Pera, Cítricos (Limón, Naranjo, Clementina; Pomelo, Kumquat, Mandarino), Uva de Mesa y vinífera, Palto, Olivo, Kiwi.	Riego por goteo	1	0
Momento de Aplicación: Primera Aplicación: Postcosecha Segunda Aplicación: Inicio de Primavera			
Cultivos	**Método de aplicación**	**Dosis (L/ha)**	**Carencia (Días)**
Papa	Al surco	0.5	0

Momento de Aplicación:
• En la plantación del tubérculo.
Aplicar al surco durante la siembra de tubérculos. Las boquillas del equipo de aspersión deben estar dirigidas de manera de mojar el tubérculo y el fondo del surco, para asegurar una distribución uniforme del producto.

Cultivos	Método de aplicación	Dosis (L/ha)	Carencia (Días)
Cebolla	Riego por goteo	0.5	0
Momento de Aplicación: Primera aplicación: 2 hojas verdaderas en cebolla.			

Aplicación y dosificación del producto: El bioestimulante biologico FURAVIA® se aplica vía riego por goteo para que penetre a la zona de las raíces. También puede ser aplicado vía inmersión de bandejas de cultivos. En caso de riego por goteo, el producto se aplicará de la manera más uniforme posible alrededor de la base de la planta para garantizar una translocación uniforme hasta las raíces. La cantidad de agua que se utilice en el riego por goteo dependerá de la cantidad de agua del sistema de riego.
El producto debe aplicarse alrededor de la base de la planta de la forma más uniforme posible. Un riego adecuado es importante para garantizar que el producto entre en contacto estrecho y continuo con las raíces. Se recomienda humedecer el suelo antes de aplicar el bioestimulante biológico FURAVIA® con el sistema de riego por goteo. Una vez aplicado el tratamiento líquido, es necesario proceder a la limpieza íntegra de las mangueras de riego y, seguidamente, regar durante el tiempo necesario para proporcionar a las plantas la humedad necesaria para su crecimiento. En este último paso es necesario evitar la eliminación del producto de la zona de las raíces.

Restricciones: La germinación de las esporas de *Bacillus paralicheniformis* (RTI184) se detiene si el suelo alcanza temperaturas inferiores a 10° C y alcanza su nivel óptimo a los 30° C. La temperatura máxima de crecimiento del *Bacillus paralicheniformis* oscila entre los 50 y los 55°C. El pH óptimo del suelo oscila entre 5,7 y 6,8, pero no se ha informado de ningún límite de pH para el rendimiento del bioestimulante biológico FURAVIA®.

Cultivos en situación de estrés: El *Bacillus paralicheniformis* RTI 184 puede aumentar la vitalidad de las plantas, incluso en condiciones adversas. Por este motivo, puede aplicarse FURAVIA® si las plantas están en situación de estrés debido a sequía, deficiencia de nutrientes, daños causados por los productos fitosanitarios u otras condiciones adversas que reducen el crecimiento de los cultivos.

Resistencia: El *Bacillus paralicheniformis* (RTI184) no tiene propiedades fungicidas o bactericidas. Además, hasta la fecha no se ha desarrollado una resistencia contra el *Bacillus paralicheniformis*. Por tanto, el riesgo de desarrollo de resistencia es bajo y no se estima necesario introducir estrategias de gestión.

Compatibilidad: El bioestimulante biológico FURAVIA® es físicamente compatible con una serie de herbicidas, insecticidas, fertilizantes y micronutrientes. La mezcla de varios productos puede causar interacciones imprevisibles. Por lo tanto, antes de mezclar los productos, se recomienda realizar una pequeña prueba de compatibilidad.
El bioestimulante biológico FURAVIA® es biológicamente incompatible con productos que contengan bactericidas, ácidos/bases fuertes, así como con productos a base a Mancozeb y Procloraz. Debe evitarse la mezcla del bioestimulante biológico FURAVIA® con este tipo de productos.

22071130 - Chile

22071130_LBL_SL-F_1L_FURAVIA_CL_3.indd 1 01/06/2026 10:21:02

ART NOVA SOLUÇÕES DIGITAIS	**Produto:** FURAVIA - 1 L	**CORES:**
	País: Brasil - Origem: Chile	■ PRETO ■ PANTONE RED 032 C ■ PANTONE 347 C
	Revisão: Rev.04 - 01/06/26	
	SKU label atual: 22071130	
	SKU label novo: 22071130 (Mesmo SKU)	
	JOB: 008/2026	
	Formato RT: 270 mm x 130 mm	
Alterações:	ICambios en el texto y inclusión de tabla (26/08/25-Ana)	