




# Aktuan<sup>®2</sup>

## FUNGIZID

- 
  - Cymoxanil wirkt kurativ bei starkem Infektionsdruck auch 1–2 Tage nach Infektionsbeginn; dringt schnell durch die Blattoberfläche und verteilt sich in den Blattzellen, so dass die nach der Behandlung zugewachsene Blattfläche geschützt wird
  - Spritzung in die Blüte möglich
- 
  - Dithianon bildet einen sehr regenbeständigen Belag mit Wirkstoffdepots auf der Pflanzenoberfläche. Diese Depots werden durch Niederschläge und Tau immer wieder aktiviert, so dass sich der Wirkstoff schrittweise auf Blättern, Trieben und Dolden ausbreitet
- 
  - Sichere Wirkstoffkombination auch bei hohem Infektionsdruck

<b>Wirkstoff</b>	100g/kg Cymoxanil + 250g/kg Dithianon
<b>Formulierung</b>	Wasserlösliches Spritzpulver (WP)
<b>Wirkstoffgruppe</b>	Azetamide, FRAC 27 und Anthraquinone, FRAC M09
<b>Wirkungsweise</b>	Cymoxanil wirkt an verschiedenen Wirkorten des Stoffwechsels der Pilze; Dithianon hemmt die Sporenkeimung und verhindert die Bildung des Keimschlauchs
<b>Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze</b>	Lokalsystemisch (Bildung von Wirkstoffdepots an der Pflanzenoberfläche) und Kontaktwirkung
<b>Kulturen</b>	Hopfenbau, Weinbau (Keltertrauben)
<b>Indikationen</b>	In Hopfen: Falscher Mehltau ( <i>Pseudoperonospora humuli</i> )
<b>Aufwandmenge</b>	Bis BBCH 37: 1,8 kg/ha Bis BBCH 55: 2,7 kg/ha Über BBCH 55: 4,0 kg/ha Max. 5 Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr im Abstand von mind. 28 Tagen; maximaler Mittelaufwand für die vorgesehene Kultur pro Jahr 10,6 kg/ha
<b>Nützlingsschonung</b>	NB6641 (B4) nicht bienengefährlich, NN3842, NN134
<b>Wartezeit</b>	14 Tage
<b>Gebindegröße</b>	5 kg
<b>Zulassung</b>	Bis 31.08.2022



**Aktuan<sup>®2</sup> – wirkt gegen Peronospora**

Peronospora-Primärfektion „Bubikopf“



Peronospora-Sekundärfektion, Doldenbefall

**Kanemite<sup>®11</sup> SC – Wirkung auf Spinnmilben (Eier, Larven und Adulte)**

Kupferbrandsymptome an Hopfenrebe und Dolde

**Exirel<sup>®</sup> – Wirkung auf den Liebstöckelrüssler**

Adulter Liebstöckelrüssler frisst am Hopfenspross



Hopfengarten im Mai