

Coragen®

INSEKTIZID



- Hochwirksam
- Schneller Fraß-Stopp
- Hervorragende Wirkungsdauer



- Nützlingsschonend,
nicht bienengefährlich (B4)



- Wichtiger Baustein im Resistenzmanagement zur Bekämpfung Freifressender Schmetterlingsraupen im Kohl



- Sehr gute Regenfestigkeit

Wirkstoff	200 g/l Rynaxypyr® (Chlorantraniliprol)
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Wirkstoffgruppe	Diamide (Anthranildiamide), IRAC 28
Wirkungsweise	Kontakt- und Fraßwirkung
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Translaminar
Kulturen	Kopfkohle (Rot-, Weiß-, Spitzkohl und Wirsing), Blumenkohle (Brokkoli, Blumenkohl) Zuckermais Kernobst, Weinrebe, Kartoffeln, Mais
Indikationen	Kopfkohle, Blumenkohle: Freifressende Schmetterlingsraupen; Zuckermais: Maiszünsler
Aufwandmenge	125 ml/ha, max. 2 Anwendungen
Bienen/Nützlinge	B4 / NN3001, NN410, NN1002
Wartezeit	Kopf- und Blumenkohle: 3 Tage, Zuckermais: 14 Tage
Gebindegröße	0,5 l, 5 l
Zulassung	Bis 31.12.2025



Coragen® in Mischung mit Netzmitteln

Durch hohe Sonneneinstrahlung und Temperaturen können die Kohlblätter eine starke Wachsschicht entwickeln. Beim Einsatz von Coragen® empfehlen wir den Zusatz eines Penetrationsmittels, das die Wirkung in das Blatt hinein optimiert (translaminare Wirkung). Ein Ablaufen der Spritzbrühe von den Kohlblättern wird so verhindert.

