FMC An Agricultural Sciences Company

Coragen®

INSEKTIZID

- ✚ Hohe Wirksamkeit auf Larven und adulte Käfer
- ✚ Schneller Fraß-Stopp durch gezielte Muskellähmung
- ✚ Nützlingsschonend und nicht bienengefährlich (B4)

Wirkstoff	200 g/l Rynaxypyr® (Chlorantraniliprol)	
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)	
Wirkstoffgruppe	Diamide (Anthranildiamide) IRAC 28	
Wirkungsweise	Kontakt- und Fraßwirkung	
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Translaminar	
Kulturen (Stadien)	Kartoffeln, Mais, Kernobst, Weinbau, Gemüsebau	
Indikationen	Kartoffeln: Kartoffelkäfer (Adulte & Larven)	
Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge	Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstauf-ruf, Kartoffeln: 60 ml/ha in 400–600 l/ha Wasser; max. 2 Anwendungen, im Abstand von min. 14 Tagen	
Abstandsauflagen	keine	Länderspezifische Mindest-Gewässer-abstände beachten (NW642-1)
Bienenschutz	Nicht bienengefährlich (B4)	
Gebindegröße	0,5 l, 5 l	
Zulassung	Bis 31.12.2025	

Coragen® – Exzellente Wirkung gegen Kartoffelkäfer
Versuch Landwirtschaftskammer NRW 2021, Kartoffelsorte: Belana, Pflanzung: 23.04.2021, Behandlung: 16.06.2021 nach Überschreitung der Schadschwelle BBCH 51

Anzahl Larven (L1–L4): zum Applikationstermin, 7 DAT, 11 DAT und 20 DAT (DAT= Tage nach Behandlung)



Quelle: FMC

Fazit: Coragen®, Mospilan®6 SG und Benevia® haben eine sehr gute Wirkung gegen Kartoffelkäfer. Coragen® zeigte die beste Langzeitwirkung bis 20 Tage nach der Behandlung.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.
Stand: 11/2022 ® Marke der FMC Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften