

Für ALLE Fälle!



Pointer® Plus

HERBIZID

- ⊕ Die Universallösung gegen Unkräuter inkl. Kletten-Labkraut
- ⊕ Wirkt hervorragend durch die Kombination von drei Wirkstoffen
- ⊕ Hochverträglicher Mischpartner, z. B. für Gräserherbizide

Wirkstoffe	83 g/kg Tribenuron-methyl, 83 g/kg Metsulfuron-methyl, 105 g/kg Florasulam	
Formulierung	Homogenes Granulatgemisch aus wasserdispergierbarem Florasulam (WG) und wasserlöslichem Tribenuron-methyl (SG) und Metsulfuron-methyl (SG)	
Wirkstoffgruppe	Metsulfuron-methyl:	Sulfonylharnstoff HRAC 2
	Tribenuron-methyl:	Sulfonylharnstoff HRAC 2
	Florasulam:	Triazolopyrimidin HRAC 2
Wirkmechanismus	ALS-Hemmer, Hemmung des Acetolactat-Synthase-Enzyms	
Wirkstoffaufnahme/-verteilung	Blatt und Boden / systemisch	
Kulturen (Stadien)	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale, Sommerweichweizen, Sommergerste & Sommerhafer (BBCH 12–39)	
Indikationen	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Acker-Kratzdistel	
Anwendungszeitpunkt / Aufwandmenge	Frühjahr, Nachauflauf, 50 g/ha	
Abstandsauflagen <small>Weitere Auflagen im Tabellenteil</small>	Hang > 2%:	0 m
	Oberflächengewässer	NW 605-1: 5 m (50%); Länderrecht (75 & 90%); NW 606: 5 m
	Saumstrukturen	NT 108: mind. 5 m (75 & 90%); Standard: 25 m
Bienenschutz	Nicht bienengefährlich (B4)	
Gebindegröße	250 g, 1 kg	

Pointer® Plus – Anwendungsempfehlung

	BBCH 12	13	21	25	30	31	39
Breite Mischverunkrautung inkl. Klettenlabkraut	Pointer® Plus 50 g/ha						
Früher Einsatz							
Breite Mischverunkrautung inkl. Kletten-Labkraut und Ungräser	Pointer® Plus 50 g/ha + Gräserherbizid						
Breite Mischverunkrautung, inkl. Kletten-Labkraut und Ehrenpreisarten	Pointer® Plus 50 g/ha + Aurora® 40 g/ha						

Von früh
bis spät:
BBCH 12 bis
BBCH 39!

Praxistipp:


Früh einsetzen,
Tankmischungen mit
einem Gräserherbizid
sind möglich!

Frühe Anwendung

Wir raten im Frühjahr in Wintergetreide zu einer frühen Anwendung, wenn im Herbst keine Unkrautbekämpfung durchgeführt wurde. Pointer® Plus lässt sich sehr gut mit einem Gräserherbizid anwenden. Die Tankmischung ist sehr breit wirksam gegen Unkräuter und Gräser.

Auch für Nachbehandlungen im Frühjahr empfehlen wir eine rechtzeitige Anwendung, um hohe Wirkungsgrade zu erreichen.

Pointer® Plus – Wirksamkeit im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten in der frühen Anwendung



■ Pointer® Plus (50g/ha) ■ Vergleichsprodukt 1 (200ml/ha) ■ Vergleichsprodukt 2 (70g/ha + 1l/ha) Quelle: FMC Feldversuche



Kamille



Klette



Storchschnabel



Klatsch-Mohn



Taubnessel



Vogelmiere



Hellerkraut



Ausfallraps



Hirtentäschel



Gänsefuß