FMC An Agricultural Sciences Company

Exirel®*

Insektizid

Genehmigung nach Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 vom 14. August – 11. Dezember 2024

DIE SPEZIELLE FORMULIERUNG OPTIMIERT DIE EXZELLENTE WIRKUNG AUF DEN RAPSERDFLOH

EXIREL®* MIT DEM WIRKSTOFF CYAZYPYR® SCHÜTZT IHREN BESTAND LÄNGER

- Rascher Fraßstopp und lange Wirkungsdauer (7 – 10 Tage)
- Sehr gute Regenfestigkeit
- Temperatur- und witterungsunabhängig

- Die Notfallzulassung von Exirel®* mit dem Wirkstoff Cyazypyr® ermöglicht den Einsatz einer neuen Wirkstoffgruppe zur Spritzanwendung im Raps zur Kontrolle von Adulten und Larven des Rapserdflohs.
- Die Formulierung von Exirel®* als Suspoemulsion wurde speziell für die translaminare und lokalsystemische Verteilung im Blatt und Stängel entwickelt.
- Die Insekten nehmen den Wirkstoff überwiegend über Fraß und teilweise über Kontakt auf und es erfolgt ein rascher Fraßstopp.

EXIREL®* GEGEN RAPSERDFLOH – VERSUCHSERGEBNISSE HERBST 2022 UND 2023

Rapserdflohbekämpfung in Winterraps
7 Auftragsversuche FMC, Deutschland
Bonituren: Vegetationsende
Eine Applikation nach Schadschwelle/Warndienst
= BBCH 11 – 16 (04.09. – 19.10.)

- **Fazit:** Die Anwendung von Exirel®* nach Erreichen der Schadschwelle im Herbst zeigt eine gute Wirksamkeit gegen den Rapserdfloh. Bis zum Vegetationsende im Herbst konnte die Anzahl der Larven pro Pflanze signifikant reduziert werden.

Rapserdflohbekämpfung in Spritzfolge in Winterraps
5 Auftragsversuche FMC, Deutschland
Bonituren: Vegetationsende
1. Applikation nach Schadschwelle/Warndienst
2. Applikation + 10 – 12 Tage

- **Fazit:** Mit der Spritzfolge aus Nexide® gegen die adulten Käfer und Exirel®* gegen die Erdflohlarven wurde bis zum Vegetationsende im Herbst eine sehr gute Wirkung auf den Rapserdfloh erzielt.

Quelle: FMC

WINTERRAPS

	Exirel®* (Notfallzulassung)	Nexide®
Kultur	Winterraps	Winterraps
Schädling	Rapserdfloh (Larven und Adulte)	Beißende Insekten, Blattläuse, Kohlschotenmücke
Aufwandmenge	0,4 l/ha in mind. 200 l/ha Wasser	0,08 l/ha in 200 – 400 l/ha Wasser
Anwendungszeitpunkt	BBCH 10 – 19 nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf	nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf
Max. Zahl der Behandlungen in dieser Anwendung, für die Kultur bzw. je Jahr	1	2
Anwendungstechnik	spritzen	spritzen
Wartezeit	F – Wartezeit nicht erforderlich	28 Tage
Anwendungsbestimmungen und Auflagen	NG364: Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Cyantraniliprole enthalten. NT102-1, NW470, NW609-2	NW607-1, NT102, NW468
Nützlinge	NB6611 (B1) bienengefährlich, NN3001	NB6641 (B4) nicht bienengefährlich, NB6623, NN3001, NN3002, NN410
Wirkstoff/Wirkstoffgruppe	100 g/l Cyazypyr® / Diamide (ISO Name: Cyantraniliprole)	60 g/l gamma-Cyhalothrin / Pyrethroide
Formulierung	Suspoemulsion (SE)	Kapselsuspension (CS)
Gebindegröße	1 l, 5 l	1 l, 5 l

Lochfraß durch adulten Rapserdfloh

Schaden durch Larve des Rapserdflohs

Larve des Rapserdflohs

Bilder: FMC

EXIREL®* – ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN IN RAPS

	BBCH 00	10	11	13	19	32
Gegen pyrethroid-resistente Rapserdflöhe: Exirel®* gegen adulte Käfer und Larven		**Exirel®*** 0,4 l/ha				
Gegen beißende Insekten inkl. pyrethroid-sensitiver Rapserdflöhe: Nexide® gegen adulte Käfer, gefolgt von Exirel®* gegen adulte Käfer und Larven		**Nexide®** 0,08 l/ha		**Exirel®*** 0,4 l/ha		
Gegen beißende Insekten inkl. pyrethroid-sensitiver Rapserdflöhe: Nexide®		**Nexide®** 0,08 l/ha				

Nexide® ist ein Insektizid gegen beißende und saugende Insekten in Raps. Nexide® enthält ausschließlich das aktive Isomer gamma-Cyhalothrin, während lambda-Cyhalothrin als Isomergemisch vorliegt. Die Wirkung von Nexide® ist vergleichbar hoch wie von lambda-Cyhalothrin-haltigen Produkten, aber mit einer niedrigeren Wirkstoffmenge.

FMC

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstraße 26, 21683 Stade
Telefon +49 41 41-92 04-0
www.fmcagro.de

FMC AUF INSTAGRAM:

Sie finden uns auch auf Instagram unter **@fmc_agro_de**

Folgen Sie uns!

Kostenlose Hotline: 0800 362 362 3

*Genehmigung nach Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 vom 14.08. – 11.12.2024 | Exirel® hat eine langfristige Zulassung im Obst- und Weinbau bis 2027. | ® Marke der FMC Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.