



**Praxistipp:**  
Bekämpfung der  
Acker-Kratzdistel mit  
35 g/ha Pointer® SX®!

# Pointer® SX®

## HERBIZID

- + Stabilere Wirkungsgrade durch wasserlösliche SX®-Formulierung
- + Sichere Wirkung gegen Distel und Kornblume
- + Sehr flexibel mischbar mit Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden und Wachstumsreglern

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Wirkstoff</b>   | 500 g/kg Tribenuron-Methyl   |   |
| <b>Formulierung</b>  | Wasserlösliches Granulat (SX®)   |   |
| <b>Wirkstoffgruppe</b>   | Sulfonylharnstoff  | HRAC 2  |
| <b>Wirkmechanismus</b>   | ALS-Hemmer, Hemmung des Acetolactat-Synthase-Enzyms  |   |
| <b>Wirkstoffaufnahme/-verteilung</b>                                       | Blatt und Boden/systemisch   |   |
| <b>Kulturen (Stadien)</b>  | Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale (BBCH 13–30 und BBCH 30–37 bei Acker-Kratzdistel); Sommerweichweizen, Sommergerste, Hafer (BBCH 13–30) Sonnenblume, Tribenuron resistent (BBCH 12–16) |   |
| <b>Indikationen</b>  | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen Kletten-Labkraut und Ehrenpreis-Arten; Acker-Kratzdistel (Winterungen, BBCH 30–37)   |   |
| <b>Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge</b>                                    | Frühjahr, Nachauflauf, Wintergetreide: 60 g/ha;<br>Acker-Kratzdistel: 37,5 g/ha<br>Frühjahr, Nachauflauf, Sommergetreide: 45 g/ha<br>Frühjahr, NA, Sonnenblume (resistente): 60 bzw. 2x 30 g/ha                      |   |
| <b>Abstandsauflagen</b><br><small>Weitere Auflagen im Tabellenteil</small> | Hang > 2%:   | 0 m   |
|  | Oberflächengewässer  | NW642: Länderrecht  |
|  | Saumstrukturen   | 37,5 & 45 g/ha: NT102: 0 m (75%);<br>Standard: 20 m<br>60 g/ha: NT103: 0 m (90%);<br>Standard: 20 m |
| <b>Bienenschutz</b>  | Nicht bienengefährlich (B4)  |   |
| <b>Gebindegröße</b>  | 200 g, 1 kg  |   |

## Pointer® SX® – Anwendungsempfehlung im Frühjahr

|   | BBCH 13                             | 21 | 25 | 30 | 31 | 37 |
|---|-------------------------------------|----|----|----|----|----|
| <b>Unkräuter inklusive Kornblume</b>            | Pointer® SX® 35–60 g/ha             |    |    |    |    |    |
| <b>Acker-Kratzdistel<br/>20–40 cm Wuchshöhe</b> | Pointer® SX® 35 g/ha                |    |    |    |    |    |
| <b>Acker-Kratzdistel<br/>ab 40 cm Wuchshöhe</b> | Pointer® SX® 35 g/ha + MCPA-Produkt |    |    |    |    |    |