

Einfacher Anfang. Sauberes Ende.

Frühe und effektive
Bekämpfung für hohen Ertrag

Successor® 600



HERBIZID

- + Andauernde Residualwirkung
- + Voraufbau-Herbizid gegen Schadgräser und breitblättrige Unkräuter
- + Entzerren von Arbeitsspitzen


Wirkstoff	600 g/l Pethoxamid	
Formulierung	Emulsionskonzentrat (EC)	
Wirkstoffgruppe	Chloracetamid	HRAC 15
Wirkmechanismus	Zellwachstumshemmer	
Wirkstoffaufnahme/-verteilung	Aufnahme erfolgt über die Wurzeln, das Hypokotyl und Keimblätter der jungen Pflanzen; teilsystemisch	
Kulturen	Mais (BBCH 00–09)	
Indikationen	Hühnerhirse, Echte Kamille, Einjähriges Rispengras	
Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge	Voraufbau, max. 1,5–2 l/ha	
Abstandsauflagen <small>Weitere Auflagen im Tabellenteil</small>	Hang > 2%:	20 m
	Oberflächengewässer	NW605-1: 5 m (50%, 75%), Länderrecht (90%), NW 606: 10 m
	Saumstrukturen	NT101: 0 m (50%, 75%, 90%), 20 m (Standard)
Bienenschutz	Nicht bienengefährlich (B4)	
Gebindegröße	10 l	

Praxistipp:

Hirsen und Unkräuter müssen im Maisanbau von Anfang an sicher und nachhaltig erfasst werden!

Successor® 600 – Anwendungsempfehlung im Mais

	BBCH 00	01	05	09	10	11
Breites Wirkspektrum: Stark gegen Hirse-Arten, Jährige Rispengras und Kamille	Successor® 600 1,5–2 l/ha					



Hühnerhirse



Echte Kamille



Einjähriges Rispengras