



# Successor® 600

## HERBIZID

- + Bodenaktives Herbizid gegen  
Schadgräser und breitblättrige Unkräuter
- + Lang andauernde  
Residualwirkung
- + Hohe Kulturpflanzenverträglichkeit  
durch Positionsselektivität

<b>Wirkstoff</b>	600 g/l Pethoxamid	
<b>Formulierung</b>	Emulsionskonzentrat (EC)	
<b>Wirkstoffgruppe</b>	Chloracetamid	HRAC 15
<b>Wirkmechanismus</b>	Zellwachstumshemmer	
<b>Wirkstoffaufnahme/-verteilung</b>	Aufnahme über die Wurzeln, das Hypokotyl und Keimblätter der jungen Pflanzen; teilsystemisch	
<b>Kulturen (Stadien)</b>	Sojabohne (BBCH 00–08)	
<b>Indikationen</b>	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras	
<b>Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge</b>	Vorauflauf, 2 l/ha in 200–400 l/ha Wasser	
<b>Abstandsauflagen</b> <small>Weitere Auflagen im Tabellenteil</small>	Hang > 2%:	20 m
	Oberflächengewässer	NW605-1: 5 m (50 %, 75 %), Länderrecht (90 %), NW606: 5 m (Standard)
	Saumstrukturen	NT101: 0 m (50 %, 75 %, 90 %), 20 m (Standard)
<b>Bienenschutz</b>	Nicht bienengefährlich (B4)	
<b>Gebindegröße</b>	10 l	

## Successor® 600 – Anwendungsempfehlung in Sojabohne

	BBCH 00–03	05	08
<b>Breite Mischverunkrautung</b>	Successor® 600 2 l/ha		
<b>Breite Mischverunkrautung mit Klettenlabkraut</b>	Successor® 600 2 l/ha + Centium® 36 CS 0,25 l/ha		