



WIRKUNGSSPEKTRUM MAISHERBIZIDE FRÜHJAHR

Auswahl wichtiger Unkräuter und Ungräser

	Successor® T	Successor® T + Diniro® + Adigor®	Successor® 600	Lupus® SX® Mais + Netzmittel	Lupus® SX® Mais + Mesotrione	Diniro® + Adigor®	Successor® 600/ Diniro® + Adigor® (NA)	Successor® 600/ Mesotrione + Lupus® SX® Mais (NA)	Successor® Top 4.0	Successor® Top 4.0 + Lupus® SX® Mais
Aufwandmenge	3–4l/ha	3,0l/ha+0,4kg/ha +1,2l/ha	1,5–2l/ha	11–15g/ha+0,1%	11–15g/ha +0,75–1l/ha	0,4kg/ha+1,2l/ha	VA: 1,5–2 l/ha NA: 0,4kg/ha+1,2l/ha	VA: 1,5–2 l/ha NA: 0,75l/ha +11–15g/ha	3l/ha+0,75l/ha	3l/ha+0,75l/ha +11–15g/ha
Unkräuter										
Acker-Kratzdistel	–	■■■■	–	■■	■■	■■■■	■■■■	■■	■	■■
Ackerwinde	–	■■■■	–	■ (■)	■ (■)	■■■■	■■■■	■	–	■
Amarant***	■■■■	■■■■	■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Ausfallraps	■■■	■■■■	–	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Ampfer-Arten	–	■■■■	–	■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■■	■	■■■
Bingelkraut	■■	■■■■	–	■	■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■	■■■
Ehrenpreis-Arten	■■■■	■■■■	■■■	■	■■	■■	■■■	■■■	■■■■	■■■■
Franzosenkraut	■■■■	■■■■	■■■	■■■ (■)	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Gänsefuß, Weißer	■■■■	■■■■	■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Kamille-Arten	■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Klettenlabkraut	■■■	■■■	■■	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■	■■■■
Knöterich, Ampfer-	■■■	■■■■	■	■■■	■■■ (■)	■■■■	■■■■	■■■	■■■	■■■■
Knöterich, Floh-	■■■	■■■■	■	■■■	■■■ (■)	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■■■
Knöterich, Vogel-	■■■	■■■	■■	■■■	■■■ (■)	■■■	■■■	■■■ (■)	■■■	■■■■
Knöterich, Winden-	■■■	■■■■	■■	■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■■	■■■	■■■■
Nachtschatten, Schwarzer	■■■■	■■■■	■■	■■	■■■■	■■	■■	■■■	■■■■	■■■■
Stechapfel	■■	■■■	■	■■■	■■	■■	■■	■■ (■)	■■	■■■
Stiefmütterchen	■■■	■■■■	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■	■■■■
Storchschnabel	■■■	■■■■	■■ (■)	■■■*	■■■*	■■	■■ (■)	■■■ (■)*	■■■	■■■■*
Taubnessel	■■■■	■■■■	■■■■	■ (■)	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Vogelmiere	■■■■	■■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Ungräser										
Ackerfuchsschwanz**	■	■■■■	■	–	–	■■■■	■■■■	■	■	■
Flughafer	■■	■■■■	■■	–	–	■■	■■	■■	■■	■■
Hirse, Borsten-	■■■	■■■■	■■ (■)	–	–	■■■■	■■■■	■■ (■)	■■■	■■■
Hirse, Finger-	■	■■	■■ (■)	–	■■	■	■■	■■ (■)	■■	■■
Hirse, Hühner-	■■■	■■■ (■)	■■ (■)	–	■■	■■■ (■)	■■■■	■■ (■)	■■■■	■■■■
Quecke	–	■■■■	–	–	–	■■■■	■■■■	–	■	■
Rispe, Einjährige	■■■■	■■■■	■■■■	–	–	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■

■■■■ sehr gute Wirkung ■■■ gute Wirkung ■■ Teilwirkung ■ nicht ausreichende Wirkung – keine Wirkung

* maximal BBCH 14 ** sensitiver Ackerfuchsschwanz *** sensitiver Amaranth

Quelle: Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 2024; Eine Information der Pflanzenschutzdienste der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen plus eigene FMC-Versuche, sowie Einstufungen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 2024