

# Maiszünslerbekämpfung – Jetzt noch einfacher!

**Coragen®**

**Arc®** farm intelligence

INSEKTIZID

✚ Langjährig bewährt, zuverlässig und temperaturunabhängig

✚ Schnell und nützlingsschonend


✚ Hohe Regenfestigkeit und UV-Stabilität für exzellente Wirkungsdauer

|                                               |                                                                                  |                                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Wirkstoff</b>                              | 200 g/l Rynaxypyr® (Chlorantraniliprol)                                          |                                                               |
| <b>Formulierung</b>                           | Suspensionskonzentrat (SC)                                                       |                                                               |
| <b>Wirkstoffgruppe</b>                        | Diamide (Anthranildiamide)                                                       | IRAC 28                                                       |
| <b>Wirkungsweise</b>                          | Kontakt- und Fraßwirkung                                                         |                                                               |
| <b>Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze</b> | Translaminar und lokalsystemisch                                                 |                                                               |
| <b>Kulturen (Stadien)</b>                     | Mais, Kartoffel, Gemüsebau, Kernobst und Weinbau                                 |                                                               |
| <b>Indikationen</b>                           | Mais: Maiszünsler                                                                |                                                               |
| <b>Anwendungszeitpunkt /Aufwandmenge</b>      | Ab Eiablage vor Schlupf<br>125 ml/ha in min. 300 l/ha Wasser; max. 2 Anwendungen |                                                               |
| <b>Abstandsauflagen</b>                       | keine                                                                            | Länderspezifische Mindest-Gewässerabstände beachten (NW642-1) |
| <b>Bienenschutz</b>                           | Nicht bienengefährlich (B4)                                                      |                                                               |
| <b>Gebindegröße</b>                           | 0,5 l, 5 l                                                                       |                                                               |

## Maiszünslerbekämpfung im Vergleich

Deutsche Versuchsreihe von 2006–2022

Eines der leistungsstärksten Insektizide



■ **Fazit:** Langjährige Versuchsreihen belegen, dass Coragen® als chemische Maßnahme das effektivste Produkt gegen den Maiszünsler mit Wirkungsgraden im Durchschnitt von über 95 % ist.

\* Trichogramma umfasst verschiedene Applikationshäufigkeiten, zwischen 1 – 4 Applikationen.

Quelle: FMC