



JORDI® POWER **NEU**

FUNGIZID

- + Optimales Resistenzmanagement durch 4 verschiedene Wirkstoffgruppen
- + Als zusätzlicher Kontaktwirkstoff sichert Folpet die Wirkung ab
- + Besonderer Schutz vor Ramularia in Gerste & Zusatzleistung gegen Septoria in Weizen


Wirkstoffe	JORDI®: 50 g/l Bixafen, 100 g/l Prothioconazol, 250 g/l Spiroxamine + NAFABO®: 500 g/l Folpet			
Formulierung	JORDI®: Emulsionskonzentrat (EC) NAFABO®: Suspensionskonzentrat (SC)			
Wirkstoffgruppe	JORDI®:	Bixafen:	Carboxamid	FRAC C1
		Prothioconazol:	Triazol	FRAC G1
		Spiroxamine:	Spiroketalamine	FRAC G2
	NAFABO®:	Folpet:	Phthalimide	FRAC M04 (Multi-site)
Wirkungsweise	JORDI®:	Protektiv, kurativ, eradikativ		
	NAFABO®:	Protektiv		
Wirkstoffaufnahme/-verteilung	JORDI®:	Systemisch		
	NAFABO®:	Kontakt		
Kulturen (Stadien)	JORDI®:	Weizen, Gerste, Roggen, Triticale (BBCH 25–61/69)		
	NAFABO®:	Weizen, Gerste (BBCH 31–59)		
Aufwandmenge	1,5 l/ha JORDI® + 1,5 l/ha NAFABO®			
Abstandsauflagen Weitere Auflagen im Tabellenteil	Hang > 2 %:	JORDI®:	20 m	
		NAFABO®:	Weizen: 0 m Gerste: 20 m	
	Oberflächengewässer	JORDI®:	NW607-1: 20 m (50 %), 15 m (75 %), 10 m (90 %), Standard n.z.	
		NAFABO®:	Weizen: NW605-2: 5 m (50 %), Länderrecht (75 % & 90 %) Gerste: NW607-2: 15 m (50 %), 10 m (75 %), 5 m (90 %)	
	Saumstrukturen	–		
Bienenschutz	Nicht bienengefährlich (B4)			
Gebindegröße	5 l JORDI® + 5 l NAFABO®			

**JORDI® POWER – die starke Kombination aus JORDI® und Folpet.
Besonders stark gegen Ramularia in Gerste und Septoria in Weizen.**




Folpet als Multi-site-Inhibitor

NAFABO® zeichnet sich durch einen besonderen Wirkmechanismus aus. Denn Folpet gehört zur Gruppe der Multi-Site-Inhibitoren. Das bedeutet, der Wirkstoff setzt an mehreren Stellen im Krankheitserreger gleichzeitig an. Diese breite Wirkung sorgt für eine hohe Wirksamkeit und minimiert gleichzeitig das Risiko der Resistenzbildung. Dadurch bleibt die Bekämpfung zuverlässig, während andere Wirkstoffklassen wie Azole oder Carboxamide langfristig geschont werden und einer Resistenzentwicklung vorgebeugt wird.



JORDI® POWER – Anwendungsempfehlung



* Bei starkem Befall von *Ramularia* in Gerste: 1,5 l/ha JORDI® + 1,5 l/ha NAFABO®

JORDI® POWER – Wirkungsspektrum

Zusatzleistung durch Folpet

Weizen	
Septoria-Blattdürre	■ ■ ■ ■
Gelbrost	■ ■ ■ ■
Blatt- und Spelzenbräune	■ ■ ■ ■
Braunrost (bis BBCH 69)	■ ■ ■
DTR-Blattdürre	■ ■ ■
Echter Mehltau	■ ■ ■
Halmbruchkrankheit (bis BBCH 37)	■ ■
Fusarium	■ ■

■ ■ ■ ■ sehr gute Wirkung ■ ■ ■ gute Wirkung ■ ■ Teilwirkung


Gerste	
<i>Ramularia collo-cygni</i>	■ ■ ■ (■)
<i>Rhynchosporium</i>	■ ■ ■ ■
Netzflecken	■ ■ ■ ■
Physiologische Blatflecken	■ ■ ■
Echter Mehltau	■ ■ ■
Zwergrost	■ ■ ■
Gelbrost	■ ■ ■
Halmbruchkrankheit	■ ■



Ramularia collo-cygni



Septoria-Blattdürre



Netzflecken



Rhynchosporium