



Clomazone sicher anwenden



Novitron® DamTec

HERBIZID

- + Zuverlässig und einfach in der Handhabung
- + Innovative Formulierung zur Reduzierung von Verflüchtigungen
- + Der Resistenzbrecher in der Kartoffel gegen Melde/Gänsefuß

Wirkstoffe	500 g/kg Aclonifen, 30 g/kg Clomazone	
Formulierung	Wasserdispersierbares Granulat (WG)	
Wirkstoffgruppe	Aclonifen: Diphenylether	HRAC 14
	Clomazone: Isoxazolidione	HRAC 13
Wirkmechanismus	Aclonifen: Solanesyl-Diphosat-Synthase-Hemmer Clomazone: Carotinoidsynthesehemmer	
Wirkstoffaufnahme/-verteilung	Aclonifen: Überwiegend über den Spross bzw. über das Hypokotyl des Keimlings; systemisch Clomazone: Vorzugsweise über die Wurzeln und den Spross, des Keimlings, auch über die grünen Pflanzenteile möglich; systemisch	
Kulturen (Stadien)	Kartoffeln	
Indikationen	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras	
Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge	Voraufbau, 2,4 kg/ha in 200–400 l/ha Wasser	
Abstandsauflagen Weitere Auflagen im Tabellenteil	Hang > 2 %:	10 m
	Oberflächengewässer	NW607-1: 20 m (50 %), 15 m (75 %), 5 m (90 %)
	Saumstrukturen	NT108: mind. 5 m (75 %, 90 %)
Bienenschutz	Nicht bienengefährlich (B4)	
Gebindegröße	12 kg	

Novitron® DamTec – Anwendungsempfehlung in Kartoffeln

	BBCH 00	03	06	09
Breite Wirkung, Metribuzin-frei	Novitron® DamTec 2,4 kg/ha			
Sehr breite dikotyle Wirkung, metribuzinfrei, inkl. Kamille	Novitron® DamTec 2,4 kg/ha + Proman® 2 l/ha			
bis spätestens 7 Tage vor dem Auflaufen/Durchstoßen, inkl. Knöterich-Arten und Schwarzer Nachschatten	Novitron® DamTec 2,4 kg/ha + Quickdown® 0,4 l/ha + Toil®			