



Praxistipp:

Bekämpfung der
Acker-Kratzdistel mit
35 g/ha Pointer® SX®!

Pointer® SX®

HERBIZID

- + Stabilere Wirkungsgrade durch wasserlösliche SX®-Formulierung
- + Sichere Wirkung gegen Distel und Kornblume
- + Sehr flexibel mischbar mit Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden und Wachstumsreglern

Wirkstoff	500 g/kg Tribenuron-Methyl	
Formulierung	Wasserlösliches Granulat (SX®)	
Wirkstoffgruppe	Sulfonylharnstoff	HRAC 2
Wirkmechanismus	ALS-Hemmer, Hemmung des Acetolactat-Synthase-Enzyms	
Wirkstoffaufnahme/-verteilung	Blatt und Boden/systemisch	
Kulturen (Stadien)	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Triticale (BBCH 13–30 und BBCH 30–37 bei Acker-Kratzdistel); Sommerweichweizen, Sommergerste, Hafer (BBCH 13–30) Sonnenblume, Tribenuron resistent (BBCH 12–16)	
Indikationen	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen Kletten-Labkraut und Ehrenpreis-Arten; Acker-Kratzdistel (Winterungen, BBCH 30–37)	
Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge	Frühjahr, Nachauflauf, Wintergetreide: 60 g/ha; Acker-Kratzdistel: 37,5 g/ha Frühjahr, Nachauflauf, Sommergetreide: 45 g/ha Frühjahr, NA, Sonnenblume (resistente): 60 bzw. 2 x 30 g/ha	
Abstandsauflagen Weitere Auflagen im Tabellenteil	Hang > 2 %:	0 m
	Oberflächengewässer	NW642: Länderrecht
	Saumstrukturen	37,5 & 45 g/ha: NT102: 0 m (75 %); Standard: 20 m 60 g/ha: NT103: 0 m (90 %); Standard: 20 m
Bienenschutz	Nicht bienengefährlich (B4)	
Gebindegröße	200 g, 1 kg	

Pointer® SX® – Anwendungsempfehlung im Frühjahr

	BBCH 13	21	25	30	31	37
Unkräuter inklusive Kornblume	Pointer® SX® 35–60 g/ha					
Acker-Kratzdistel 20–40 cm Wuchshöhe	Pointer® SX® 35 g/ha					
Acker-Kratzdistel ab 40 cm Wuchshöhe	Pointer® SX® 35 g/ha + MCPA-Produkt					