

Einfacher Anfang. Sauberes Ende.

Frühe und effektive
Bekämpfung für hohen Ertrag

Successor® 600



HERBIZID

+ Andauernde
Residualwirkung

+ Vorauflauf-Herbizid gegen Schadgräser
und breitblättrige Unkräuter

+ Entzerren von Arbeitsspitzen

Wirkstoff	600 g/l Pethoxamid	
Formulierung	Emulsionskonzentrat (EC)	
Wirkstoffgruppe	Chloracetamid HRAC 15	
Wirkmechanismus	Zellwachstumssthemmer	
Wirkstoffaufnahme/-verteilung	Aufnahme erfolgt über die Wurzeln, das Hypokotyl und Keimblätter der jungen Pflanzen; teilsystemisch	
Kulturen	Mais (BBCH 00–09)	
Indikationen	Hühnerhirse, Echte Kamille, Einjähriges Rispengras	
Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge	Vorauflauf, max. 1,5–2 l/ha	
Abstandsauflagen <small>Weitere Auflagen im Tabellen teil</small>	Hang > 2 %:	20 m
	Oberflächengewässer	NW605-1: 5 m (50 %, 75 %), Länderrecht (90 %), NW606: 10 m
	Saumstrukturen	NT101: 0 m (50 %, 75 %, 90 %), 20 m (Standard)
Bienenschutz	Nicht bienengefährlich (B4)	
Gebindegröße	10 l	

Praxistipp:

Hirschen und Unkräuter müssen im Maisanbau von Anfang an sicher und nachhaltig erfasst werden!

Successor® 600 – Anwendungsempfehlung im Mais

	BBCH 00	01	05	09	10	11
Breites Wirkspektrum: Stark gegen Hirse-Arten, Jährige Rispe und Kamille						



Hühnerhirse



Echte Kamille



Einjähriges Rispengras