



# Successor® 600

## HERBIZID

<b>+</b> Bodenaktives Herbizid gegen Schadgräser und breitblättrige Unkräuter	<b>+</b> Lang andauernde Residualwirkung	<b>+</b> Hohe Kultupflanzenverträglichkeit durch Positionsselektivität
---	--	--

<b>Wirkstoff</b>	600 g/l Pethoxamid
<b>Formulierung</b>	Emulsionskonzentrat (EC)
<b>Wirkstoffgruppe</b>	Chloracetamid HRAC 15
<b>Wirkmechanismus</b>	Zellwachstumshemmer
<b>Wirkstoffaufnahme/-verteilung</b>	Aufnahme über die Wurzeln, das Hypokotyl und Keimblätter der jungen Pflanzen; teilsystemisch
<b>Kulturen (Stadien)</b>	Sojabohne (BBCH 00–08)
<b>Indikationen</b>	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras
<b>Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge</b>	Vorauflauf, 2 l/ha in 200–400 l/ha Wasser
<b>Abstandsauflagen</b> Weitere Auflagen im Tabellenteil	Hang > 2 %: 20 m Oberflächengewässer NW605-1: 5 m (50 %, 75 %), Länderecht (90 %), NW606: 5 m (Standard) Saumstrukturen NT101: 0 m (50 %, 75 %, 90 %), 20 m (Standard)
<b>Bienenschutz</b>	Nicht bienengefährlich (B4)
<b>Gebindegröße</b>	10 l

## Successor® 600 – Anwendungsempfehlung in Sojabohne

	BBCH 00–03	05	08
<b>Breite Mischverunkrautung</b>			
	<b>Successor® 600 2 l/ha</b>		
<b>Breite Mischverunkrautung mit Klettenlabkraut</b>		<b>Successor® 600 2 l/ha + Centium® 36 CS 0,25 l/ha</b>	