



WIRKUNGSSPEKTRUM MAISHERBIZIDE

Auswahl wichtiger Unkräuter und Ungräser

	Successor® T	Successor® T + Diniro® + Adigor®	Successor® 600	Lupus® SX® Mais + Netzmittel	Lupus® SX® Mais + Mesotriolone	Diniro® + Adigor®	Successor® 600/ Diniro® + Adigor® (NA)	Successor® 600/ Mesotriolone + Lupus® SX® Mais (NA)	Successor® Top 4.0	Successor® Top Lupus® SX® Mais
Aufwandmenge	3,0–4,0 l/ha	3,0 l/ha + 0,4 kg/ha + 1,2 l/ha	1,5–2,0 l/ha	11–15 g/ha + 0,1 %	11–15 g/ha + 0,75–1,0 l/ha	0,4 kg/ha + 1,2 l/ha	VA: 1,5–2,0 l/ha NA: 0,4 kg/ha + 1,2 l/ha	VA: 1,5–2,0 l/ha NA: 0,75 l/ha + 11–15 g/ha	3,0 l/ha + 0,75 l/ha	3,0 l/ha + 11–15 g/ha
Unkräuter										
Acker-Kratzdistel	–	■ ■ ■ ■	–	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■	■ ■
Ackerwinde	–	■ ■ ■ ■	–	■ (■)	■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	–	■
Amarant***	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Ausfallraps	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	–	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Ampher-Arten	–	■ ■ ■ ■	–	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■
Bingelkraut	■ ■	■ ■ ■ ■	–	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■
Ehrenpreis-Arten	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Franzosenkraut	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Gänsefuß, Weißer	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Kamille-Arten	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Klettenlabkraut	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Knöterich, Ampfer-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Knöterich, Floh-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Knöterich, Vogel-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Knöterich, Winden-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Nachtschatten, Schwarzer	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Stechapfel	■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Stiefmütterchen	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Storchschnabel	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ (■)	■ ■ ■ *	■ ■ ■ *	■ ■ ■ ■	■ ■ (■)	■ ■ ■ (■) *	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ *
Taubnessel	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Vogelmiere	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Ungräser										
Ackerfuchsschwanz**	■	■ ■ ■ ■	■	–	–	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■	■
Flughäfer	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	–	–	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Hirse, Borsten-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ (■)	–	–	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Hirse, Finger-	■	■ ■	■ ■ (■)	–	–	■	■ ■	■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Hirse, Hühner-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ (■)	■ ■ (■)	–	■ ■ ■ ■	■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Quecke	–	■ ■ ■ ■	–	–	–	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	–	■	■
Rispe, Einjährige	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	–	–	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ sehr gute Wirkung ■ ■ ■ gute Wirkung ■ ■ Teilwirkung ■ nicht ausreichende Wirkung – keine Wirkung
* maximal BBCh 14 ** sensibler Ackerfuchsschwanz *** sensibler Amarant

Quelle: Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 2024; Eine Information der Pflanzenschutzdienste der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen plus eigene FMC-Versuche, sowie Einstufungen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 2025