

Gesunder Start – Ertragreiche Ernte in Kohl

BREITE WIRKSTOFFPALETTE IM KOHL

FMC bietet ein starkes Insektizidportfolio im Kohl mit Wirkstoffen, die nicht nur Schädlinge effektiv kontrollieren, sondern auch wichtige Bausteine in einer Spritzfolge zur Vorbeugung von Resistenzen sind. Eine frühzeitige Schädlingsbekämpfung im Kohlanbau ist entscheidend, um den Befall von Schädlingen effektiv zu verhindern. Nur so kann eine ungestörte Entwicklung der Pflanzen und somit eine ausgezeichnete Qualität sichergestellt werden.

Ideal
kombinierbar
mit **All In**,
Markenblatt-
dünger

INSEKTIZIDE – EXZELLENTER SCHUTZ DER PFLANZEN VON ANFANG BIS ENDE

Verimark® INSEKTIZID

- Kleine Kohlfiegen
- Sehr gute Wirkungsdauer
- Optimierte Aufnahme über die Wurzel
- Systemische Verteilung in der Pflanze: schützt die Wurzel, Blätter und den Neuzuwachs

NEXSUBA® INSEKTIZID

- Freifressende Schmetterlingsraupen; Thripse; Kleine Kohlfiegen
- Schnelle Wirkung
- Gute Kulturverträglichkeit
- Einsetzbar im ökologischen Landbau

KOHLMOTTEN-MONITORING MIT ARC® FARM INTELLIGENCE

Mit unserem kostenlosen, digitalen Serviceangebot Arc® farm intelligence ist es möglich, die Bekämpfung der Kohlmotte zu vereinfachen und zu präzisieren. Die App hilft Ihnen beim Monitoring der Kohlmotte und unterstützt bei der Terminierung der Bekämpfungsmaßnahme. Damit wird die Effizienz der Bekämpfungsmaßnahme gesteigert und der Ertrag optimiert.

Details zum Funktionsumfang der App erhalten Sie auf www.fmc-arc.de



Coragen® INSEKTIZID

- Freifressende Schmetterlingsraupen
- Hochwirksam
- Nützlichschonend
- Baustein im Resistenzmanagement

Benevia® INSEKTIZID

- Freifressende Schmetterlingsraupen
- Weiße Fliegen; Kleine Kohlfiegen
- Spezieller Wirkmechanismus
- Sehr gute Regenfestigkeit
- Schneller und effektiver Schutz

Mospilan® SG INSEKTIZID

- Weiße Fliegen; Blattläuse
- Lange Wirkungsdauer
- Wetterunabhängig
- Erfasst auch versteckt lebende und wandernde Insekten

Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)	Suspensionskonzentrat (SC)	Dispersion in Öl (OD)
Wirkstoffgruppe	Diamide (Anthranildiamide), IRAC 28	Diamide (Anthranildiamide), IRAC 28	Diamide (Anthranildiamide), IRAC 28
Wirkungsweise	Kontakt- und Fraßwirkung	Kontakt- und Fraßwirkung	Kontakt- und Fraßwirkung
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Systemisch	Lokalsystemisch und translaminar	Systemisch und translaminar
Kulturen	Jungpflanzenanzucht Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl), Blumenkohle (Blumenkohle, Brokkoli), Kleine Kohlfleie	Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) und Blumenkohle (Blumenkohl und Brokkoli)	Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Kohlrabi und Rosenkohl
Aufwandmenge/Anzahl Anwendungen pro Kultur und Jahr	Jungpflanzenanzucht: 15ml/1.000 Pflanzen gießen, max. 1 Anw.	0,125 l/ha, max. 2 Anw.	Blattläuse: 0,25 kg/ha, max. 2 Anw. Weiße Fliege: 0,325 kg/ha, max. 2 Anw.
Anwendungszeitpunkt	Jungpflanzenanzucht: von 2. bis 5. Laubblatt entfaltet (BBCH 12 – 15)	Bei Beginn der Eiablage	Kopfkohl: BBCH 41–49 Kohlrabi: ab BBCH 14 Rosenkohl: ab BBCH 47
Wartezeit	F (nicht erforderlich)	3 Tage	Kopfkohl, Kohlrabi: 14 Tage Rosenkohl: 21 Tage



200 g/l
Cyazypyr®



480 g/l
Spinosad



200 g/l
Rynaxypyr®



100 g/l
Cyazypyr®



200 g/kg
Acetamiprid