



# Venzar® 500 SC

## HERBIZID



■ Mit Lenacil zweifach\* (primär & sekundär) stark gegen Unkräuter

■ Idealer Misch- und Bodenpartner zur Vervollständigung des Wirkspektrums, auch gegen Problemunkräuter



■ Wichtiger Wirkstoff für mehr Bodenwirkung mit langer Wirkungsdauer

<b>Wirkstoff</b>	500 g/l Lenacil
<b>Formulierung</b>	Suspensionskonzentrat (SC)
<b>Wirkstoffgruppe</b>	Uracile; HRAC: 5
<b>Wirkmechanismus</b>	Hemmung des Photosystem II
<b>Wirkstoffaufnahme/-verteilung</b>	Vorwiegend über die Wurzeln; systemisch
<b>Kulturen</b>	Beten (Rote, Gelbe, Weiße)
<b>Indikationen</b>	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
<b>Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge</b>	Beten (Rote, Gelbe, Weiße) (BBCH 10–31): 1 l/ha in 150–600 l/ha Wasser oder als Splittinganwendung im Abstand von 5–8 Tage: 2 x 0,5 l/ha; 3 x 0,33 l/ha; 4 x 0,25 l/ha in jeweils 150–600 l/ha Wasser
<b>Bienen/Nützlinge</b>	B4 / NN2001, NN2002
<b>Wartezeit</b>	N
<b>Gebindegröße</b>	1 l, 5 l


### \*So wirkt Lenacil:

#### I. Primärwirkung

Lenacil hemmt die pflanzliche Photosynthese. Das führt bei Unkräutern zu Blattaufhellung und Nekrose.

#### II. Sekundärwirkung

Lenacil bewirkt bei Unkräutern zusätzlich das Öffnen der Spaltöffnungen und verhindert das Schließen. Es kommt zu unkontrollierter Verdunstung und Wasserverlust.



#### GUT ZU WISSEN

Die Splitting-Anwendung ermöglicht Anwendung auf drainierten Flächen.