



Verimark®

Gießbehandlung von Kohl-Jungpflanzen im Freiland

INSEKTIZID



- Formulierung für die Aufnahme über die Wurzel optimiert
- Schützt die Wurzel, Blätter und den Neuzuwachs über die systemische Verteilung in der Pflanze



- Gezielte Wirkstoffausbringung in Wurzelnähe durch Gießverfahren an den Jungpflanzen



- Sehr gute Wirkungsdauer (bis zu 3 Wochen)
- Effektive Bekämpfung der an den Wurzeln sitzenden Larven

Wirkstoff	200 g/l Cyazypyr® (Cyantraniliprol)
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Wirkstoffgruppe	Diamide (Anthranildiamide), IRAC: 28
Wirkungsweise	Kontakt- und Fraßwirkung
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Systemisch
Kulturen	Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl), Blumenkohle
Indikationen	Kopfkohle, Blumenkohle: Kleine Kohlfliege
Anwendungsbereich	Freiland
Aufwandmenge/Anwendungstechnik	Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl, Blumenkohl, Brokkoli: 15 ml/1.000 Pflanzen in max. 30 l Wasser pro 1.000 Pflanzen/gießen; max. 600 ml/ha (entspricht max. 40.000 Pflanzen pro ha), max. 1 Anwendung
Bienen/Nützlinge	B1 / NN3001, NN1002
Wartezeit	Kopfkohle, Blumenkohle: XF (nicht erforderlich)
Gebindegröße	1 l



Larve der Kleinen Kohlfliege



Thripse fliegen in Gewächshäuser ein und schädigen dort Gurken, Paprika und Auberginen



Tropfbewässerung im Gewächshaus in Gemüsekulturen und Erdbeeren



- Systemische Wirkung – Aufnahme über die Wurzel und Verteilung in der Pflanze
- Wirkt gegen ein breites Spektrum saugender und beißender Schädlinge



- Schnelle Anfangswirkung, Lange Wirkungsdauer



- Nützlingsschonend – Erhaltung der Nützlingspopulationen, die zur Schädlingsbekämpfung beitragen können

Wirkstoff	200 g/l Cyazypyr® (Cyantraniliprol)
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Wirkstoffgruppe	Diamide (Anthranildiamide), IRAC: 28
Wirkungsweise	Kontakt- und Fraßwirkung
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Systemisch
Kulturen	Gemüsekulturen und Erdbeeren unter Glas als Hydrokultur oder in Kulturgefäßen
Indikationen	Freifressende Schmetterlingsraupen, Blattläuse, Weiße Fliegen, blattminierende Insekten, Eulenarten (Noctuidae), Tomatenminiermotte (<i>Tuta absoluta</i>), Erdbeerblütenstecher
Anwendungsbereich	Gewächshaus Kulturverfahren auf versiegelten Flächen mit Auffangsystemen für ablaufendes Wasser
Aufwandmenge/ Anwendungstechnik	Gemüsebau: 500 ml/ha; 2 – 4 Behandlungen, Erdbeere: 375 ml/ha; 4 Behandlungen mindestens 2.000 l/ha Wasser, Tropfen; Tropfbewässerung / Reihenbehandlung
Bienen/Nützlinge	B1 / NN3001, NN1002
Wartezeit	1 Tag
Gebindegröße	1 l

Verimark® – Zulassungen in vielen Gemüsekulturen und Erdbeeren

Kultur	Schädlinge
Buschbohne, Stangenbohne	Freifressende Schmetterlingsraupen, Blattläuse, Weiße Fliegen, blattminierende Insekten, Eulenarten (<i>Noctuidae</i>)
Gurke, Zucchini	
Melone, Wassermelone	
Aubergine, Tomate	Freifressende Schmetterlingsraupen, Blattläuse, Weiße Fliegen, blattminierende Insekten, Eulenarten (<i>Noctuidae</i>), Tomatenminiermotte (<i>Tuta absoluta</i>)
Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili)	
Erdbeere	Freifressende Schmetterlingsraupen, Blattläuse, Eulenarten (<i>Noctuidae</i>), Erdbeerblütenstecher