



Exirel®

**Neu: Zulassung gegen
Grüne Rebzikade**

INSEKTIZID



■ Schneller und effektiver Schutz der Kultur



■ Temperatur- und witterungsunabhängig



■ Sehr gute Regenfestigkeit

Wirkstoff	100 g/l Cyazypyr® (Cyantraniliprole)		
Formulierung	Suspoemulsion (SE)		
Wirkstoffgruppe	Diamide (Anthranildiamide), IRAC 28		
Wirkungsweise	Kontakt- und Fraßwirkung		
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Lokalsystemisch und translaminar		
Kulturen	Weinrebe (Nutzung als Keltertraube)		
Indikationen	Wickler (<i>Tortricidae</i>)	Rebzikade (<i>Empoasca vitis</i>)	Kirschessigfliege (<i>Drosophila suzukii</i>)
Aufwandmenge	0,75 l/ha in max. 500 l Wasser/ha; max. 1 Anwendung		0,5 l/ha in max. 200–300 l Wasser/ha; max. 1 Anwendung
Anwendungstechnik	spritzen oder sprühen		spritzen oder sprühen/nur zur Behandlung der Traubenzone
Anwendungszeitpunkt	BBCH 55–85, nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf, ausgenommen Blütezeit	BBCH 55–57 oder BBCH 71–85	BBCH 71–85, nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf
Bienen/Nützlinge	NB 6611 (B1) bienengefährlich, NN3001, NN1002. Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.		
Wartezeit	Wickler, Kirschessigfliege: 10 Tage Rebzikade: 14 Tage		
Gebindegröße	1 l, 5 l		

■ Schnelle und hohe Regenfestigkeit

Durch die translaminare Verlagerung kann der Wirkstoff nicht mehr abgewaschen werden.

■ Temperaturunabhängigkeit

Exirel® wirkt auch bei sehr hohen Temperaturen unverändert gut.



Traubenwickler



Rebzikade



Kirschessigfliege