



GUT ZU WISSEN

Die Splitting-Anwendung ermöglicht Anwendung auf drainierten Flächen.

Venzar® 500 SC

HERBIZID



- Mit Lenacil zweifach* (primär & sekundär) stark gegen Unkräuter
- Idealer Misch- und Bodenpartner zum vervollständigen des Wirkspektrums, auch gegen Problemunkräuter



- Lange Wirkungsdauer

Wirkstoff	500 g/l Lenacil
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Wirkstoffgruppe	Uracile, HRAC: 5
Wirkungsweise	Hemmung des Photosystem II
Wirkstoffaufnahme/-verteilung	Vorwiegend über die Wurzeln; systemisch
Kulturen	Erdbeere
Anwendungsbereich	Freiland
Verwendungszweck und Anwendungszeitpunkt	<p>1) Nicht im Ertrag stehende Anlagen Im Pflanzjahr UND nach dem Pflanzen</p> <p>2) Ertragsanlagen Nach der Ernte UND zum Abschluss des vegetativen Wachstums im Sommer</p> <p>3) Vermehrungsgut Nach dem Pflanzen</p>
Indikationen	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
Anwendungshäufigkeit	in dieser Anwendung: max. 2 für die Kultur bzw. je Jahr: max. 2 im Abstand von 5 bis 7 Tage
Anwendungstechnik	Spritzen im Splittingverfahren (2 Behandlungen)
Aufwandmenge	Zeitpunkt 1: 0,5 l/ha 200-400 l/ha Wasser Zeitpunkt 2: 0,5 l/ha 200-400 l/ha Wasser
Bienen/Nützlinge	B4 / NN2001, NN2002
Wartezeit	F
Gebindegröße	1 l, 5 l


***So wirkt Lenacil:**

I. Primärwirkung

Lenacil hemmt die pflanzliche Photosynthese. Das führt bei Unkräutern zu Blattaufhellung und Nekrose.

II. Sekundärwirkung

Lenacil bewirkt bei Unkräutern zusätzlich das Öffnen der Spaltöffnungen und verhindert das Schließen. Es kommt zu unkontrollierter Verdunstung und Wasserverlust.



Schließzellen der Stomata werden durch Lenacil blockiert