



Verimark®

Tropfbewässerung im Gewächshaus in Gemüsekulturen und Erdbeeren

INSEKTIZID



- Systemische Wirkung – Aufnahme über die Wurzel und Verteilung in der Pflanze
- Wirkt gegen ein breites Spektrum saugender und beißender Schädlinge



- Nützlingsschonend – Erhaltung der Nützlingspopulationen, die zur Schädlingsbekämpfung beitragen können



- Schnelle Anfangswirkung, Lange Wirkungsdauer

Wirkstoff	200 g/l Cyazypyr® (Cyantraniliprol)
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Wirkstoffgruppe	Diamide (Anthranildiamide), IRAC: 28
Wirkungsweise	Kontakt- und Fraßwirkung
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Systemisch
Kulturen	Erdbeeren
Indikationen	Freifressende Schmetterlingsraupen, Blattläuse, Eulenarten (<i>Noctuidae</i>), Erdbeerblütenstecher
Aufwandmenge	0,375 l/ha in mindestens 2.000 l/ha Wasser, max. 4 Anwendungen (Abstand mindestens 7 Tage)
Anwendungsbereich	Gewächshaus
Anwendungstechnik	Tropfen
Erläuterungen zur Kultur	Hydrokultur
Anwendungsbereich: Erläuterungen	Kulturverfahren auf versiegelten Flächen mit Auffangsystemen für ablaufendes Wasser
Anwendungstechnik: Erläuterungen	Tropfbewässerung / Reihenbehandlung
Nützlinge	B1 / NN3001, NN1002
Wartezeit	1 Tag
Gebindegröße	1 l