

# IHRE LÖSUNGEN IM GRÜNLAND

## Harmony® SX®

### HERBIZID

- + Systemisch, wurzeltief und nachhaltig gegen Ampfer-Arten
- + Verträglich für Gräser, schonend für Klee
- + Ohne Nutzungseinschränkung nach kurzer Wartezeit (14 Tage)

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Wirkstoff                                                           | 500 g/kg Thifensulfuron-methyl                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| Formulierung                                                        | Wasserlösliches Granulat (SG)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| Wirkstoffgruppe                                                     | Sulfonylharnstoff                      HRAC 2                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| Wirkmechanismus                                                     | ALS-Hemmer, Hemmung der Acetolactat-Synthase                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| Wirkstoffaufnahme/-verteilung                                       | Schnelle Blattaufnahme über alle grünen Pflanzeteile des Ampfers; systemisch                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| Kulturen (Stadien)                                                  | Wiesen, Weiden (während der Vegetationsperiode)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| Indikationen                                                        | Ampfer-Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge                                    | <b>Flächenbehandlung (nicht im Ansaatzjahr):</b><br>45 g/ha<br><b>Einzelpflanzenbehandlung (max. 45 g/ha Jahr):</b><br>3,75 g in 10 l Wasser für Dochtstreichgerät<br>11 g in 10 l Wasser für Walzenstreichgeräte (z. B. Rotowiper)<br>1,5 g in 10 l Wasser für Spritzverfahren mit Einzeldüse (z.B. Rückenspritze) |                                                |
| Abstandsauflagen<br><small>Weitere Auflagen im Tabellenteil</small> | Hang > 2 %:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 m                                            |
|                                                                     | Oberflächengewässer                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NW605: 5 m (50 %),<br>Länderrecht (75 %, 90 %) |
|                                                                     | Saumstrukturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NT103: 0 m (90 %), 20 m (Standard)             |
| Bienenschutz                                                        | Nicht bienengefährlich (B4)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| Gebindegröße                                                        | 90 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |

### Starkes Solo – Bestleistung im Team bei breiter Mischverunkrautung in Altnarben

- Wenn Ampfer und andere minderwertige Platz- und Nährstoffräuber die Futterqualität im Grünland negativ beeinflussen, wird die Tankmischung aus Harmony® SX® und U46® M-Fluid empfohlen!


#### Praxistipp:

Kennen Sie schon die Möglichkeit zur automatisierten, selektiven Ampferbekämpfung im Grünland? Harmony® SX® ist dafür genau richtig!

| Frühjahr     | Sommer | Herbst | Winter |
|--------------|--------|--------|--------|
| Harmony® SX® |        |        |        |

**NEU: Nuyard® Insektizid  
(100 g/l Deltamethrin) gegen  
Fritfliegen in Wiesen und Weiden  
(Neueinsaat oder Nachsaat)**

### Optimaler Einsatztermin von Harmony® SX® gegen Ampfer:



### Das bringt Ihnen Harmony® SX®

| Wirkungsspektrum       | Harmony® SX®<br>45 g/ha | U46® M-Fluid<br>1,5 l/ha | Tankmischung<br>Harmony® SX® 45 g/ha<br>+ U46® M-Fluid 1,5 l/ha |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ampfer-Arten           | ■ ■ ■ ■                 | ■                        | ■ ■ ■ ■                                                         |
| Bärenklau              | ■                       | ■                        | ■ ■                                                             |
| Distel                 | ■ ■                     | ■ ■ ■                    | ■ ■ ■                                                           |
| Hahnenfuß, Kriechender | ■ ■                     | ■                        | ■ ■ ■                                                           |
| Hahnenfuß, Scharfer    | ■ ■                     | ■ ■ ■                    | ■ ■ ■                                                           |
| Hirtentäschel          | ■                       | ■ ■ ■                    | ■ ■ ■                                                           |
| Kälberkropf            | ■ ■ ■                   | —                        | ■ ■ ■                                                           |
| Kümmel                 | ■ ■ ■                   | ■                        | ■ ■ ■ ■                                                         |
| Löwenzahn              | ■                       | ■ ■ ■                    | ■ ■ ■                                                           |
| Schafgarbe             | ■ ■                     | ■                        | ■ ■ ■                                                           |
| Vogelmiere             | ■ ■ ■                   | ■                        | ■ ■ ■                                                           |
| Wiesen-Kerbel          | ■                       | ■                        | ■ ■                                                             |
| Wiesen-Storchnabel     | ■ ■                     | ■                        | ■ ■ ■                                                           |

■ ■ ■ ■ sehr gute Wirkung   ■ ■ ■ gute Wirkung   ■ ■ Teilwirkung   ■ nicht ausreichende Wirkung

Quelle: FMC Versuche