



Praxistipp:

BeFlex® – Der Extrakick
gegen Ackerfuchsschwanz
und Windhalm!

BeFlex®

HERBIZID

- + Breites Unkrautspektrum und flexibler Mischpartner
- + Baustein im Resistenz-Management gegen Windhalm und Unkräuter
- + Sehr verträglich in allen Wintergetreidearten

Wirkstoffe	500 g/l Bflubutamid	
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)	
Wirkstoffgruppe	Phenylether HRAC 12	
Wirkmechanismus	Hemmung der Phytonene Desaturase	
Wirkstoffaufnahme/-verteilung	Bodenaktiv; überwiegend über Wurzeln und Keimsporn (Hypokotyl)/systemisch	
Kulturen (Stadien)	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale (BBCH 09–25)	
Indikation	Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	
Anwendungszeitpunkt / Aufwandmenge	Herbst, nach dem Auflaufen, 0,5 l/ha	
Abstandsauflagen Weitere Auflagen im Tabellenteil	Hang > 2%:	10 m
	Oberflächengewässer	NW605: 5 m (50 %, 75 %), Länderrecht (90 %)
	Saumstrukturen	0 m
Bienenschutz	Nicht bienengefährlich (B4)	
Gebindegröße	1 l, 5 l	

BeFlex® bekämpft Windhalm und zweikeimblättrige Unkräuter in Wintergetreide

Optimaler Anwendungszeitpunkt ist Voraufbau bis früher Nachaufbau (BBCH 09–10). BeFlex® ist flexibel mischbar mit anderen Herbiziden. In Tankmischung mit Battle® Delta (Flufenacet + Diflufenican) verbessert es die Gräserwirkung, gibt den Extrakick!

BeFlex® enthält den Wirkstoff Bflubutamid

BeFlex® bekämpft Gemeinen Windhalm und wichtige einjährige Getreideunkräuter.



Gemeiner Windhalm



Acker-Stiefmütterchen



Taubnessel



Ausfallraps



Vogelmiere



BeFlex® – Anwendungsempfehlungen in Getreide

BBCH 00–07	09	10	11	12	13
	BeFlex® 0,5l/ha optimaler Einsatz				
	BeFlex® 0,4l/ha + Partner (z. B. Piroseo®) (siehe Tankmischoptionen)				

BeFlex® – Tankmischoptionen* für Windhalm-Standorte

	BeFlex® 0,5l/ha	BeFlex® 0,4l/ha + Carmina® 640 1,5l/ha	BeFlex® 0,4l/ha + Piroseo® 2,0l/ha (BeFlex® Pro)	BeFlex® 0,5l/ha + Piroseo® 2,5l/ha	BeFlex® 0,4l/ha + Flufenacet**1 0,25l/ha
Ungräser					
Ackerfuchsschwanz	–	■	■	■ ■	■ ■ ■
Rispengras, Einjähriges	■ ■	■ ■ ■ (■)	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Weidelgras-Arten	–	■ ■	–	■	■ ■
Windhalm, Gemeiner	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Unkräuter					
Acker-Vergissmeinnicht	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Ehrenpreis-Arten	■ ■	■ ■ ■ (■)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■
Erdrauch, Gemeiner	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Hundskerbél	■	■ ■ ■	■	■	■
Kamille-Arten	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Klatsch-Mohn	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Kletten-Labkraut	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Kornblume	■	■ ■ ■	■	■	■
Raps, Ausfall-	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Stiefmütterchen-Arten	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Storchschnabel-Arten	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Taubnessel, Rote	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Vogelmiere	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■

■ ■ ■ ■ sehr gute Wirkung ■ ■ ■ gute Wirkung ■ ■ Teilwirkung ■ nicht ausreichende Wirkung

Quelle: FMC Versuche

* Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen der Tankmischpartner

** ca. 120 g/ha Wirkstoff

¹ Aufbrauchfristen von flufenacethaltigen Produkten beachten