




Nuyard®

NEU

INSEKTIZID

- + Schnell einsetzende Kontakt- und Fraßwirkung → Knock-Down-Wirkung
- + Sehr breites Wirkungsspektrum
- + 3 Anwendungen in Raps von Herbst bis Sommer möglich (BBCH 11–69)

Wirkstoff	100 g/l Deltamethrin
Formulierung	Emulsionskonzentrat (EC)
Wirkstoffgruppe	Pyrethroid Klasse 2 IRAC 3A
Wirkungsweise	Kontakt- und Fraßwirkung
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Kontaktmittel
Kulturen	Winterraps
Indikationen	Beißende Insekten, Kohlschotenmücke, Rübsenblattwespe
Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge	Beißende Insekten (ausg. Kohlrübenblattwespe): BBCH 11–69; 1 x 0,075 l/ha Beißende Insekten (ausg. Kohlschotenmücke, Kohlrübenblattwespe): BBCH 20–69; 1 x 0,075 l/ha Kohlschotenmücke: BBCH 55–69; 1 x 0,05 l/ha Kohlrübenblattwespe: BBCH 12–29; 1 x 0,05 l/ha Kohlrübenblattwespe: BBCH 20–29; 1 x 0,05 l/ha Max. 3 Anwendungen für die Kultur bzw. je Jahr
Abstandsauflagen Weitere Auflagen im Tabellenteil	Beißende Insekten (ausg. Kohlrübenblattwespe): NG405; NT103; NW607-1: 90 % 15 m Beißende Insekten (ausg. Kohlschotenmücke, Kohlrübenblattwespe): NT103; NW607-1; 90 % 15 m; NW800 Kohlschotenmücke: NT103; NW607-1: 75 % 20 m, 90 % 10 m, NW800 Kohlrübenblattwespe (BBCH 12–29): NG405; NT103; NW607-1: 75 % 20 m, 90 % 10 m Kohlrübenblattwespe (BBCH 20–29): NT103; NW607-1: 75 % 20 m, 90 % 10 m; NW800
Bienenschutz	B2
Gebindegröße	1 l, 5 l



Rapserdfloh




Blattläuse Raps



Rübsenblattwespe



Nuyard® – Anwendungsempfehlung



FMC-RAPSINSEKTIZIDE 2026 / 2027

Produkt	Wirkstoff	Wirkstoffgehalt	IRAC-Gruppe
Nuyard®	Deltamethrin	100 g/l	3A
Exirel®*	Cyantraniliprole	100 g/l	28
Mospilan® SG*	Acetamiprid	200 g/kg	4A

* Genehmigung nach Art. 53 (Notfallzulassung) vom 14.08.–11.12.2025; Notfallzulassung 2026 wird angestrebt.

Alle Insektizide sind im 1l- und 5l-Gebinde erhältlich.



Großer Rapsstängelrüssler



Gefleckter Kohltriebrüssler



Rapsglanzkäfer