

Praxistipp:
Metazachlor- und Clomazonefrei im Vorauflauf!

Successor® 600

HERBIZID

✚ Metazachlor-frei ✚ Tankmischpartner im Vorauflauf ✚ Sehr gute Wirkung gegen Kamille-Arten, Storchschnabel-Arten, Einjährige Rispe, Weidelgras und Windhalm

Wirkstoffe	600 g/l Pethoxamid	
Formulierung	Emulsionskonzentrat (EC)	
Wirkstoffgruppe	Chloracetamid HRAC 15	
Wirkmechanismus	Zellwachstumshemmer	
Wirkstoffaufnahme/-verteilung	Teilsystemisch; Aufnahme erfolgt über die Wurzeln, das Hypokotyl und Keimblätter der jungen Pflanzen	
Kulturen (Stadien)	Winterraps (BBCH 00–09)	
Indikation	Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	
Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge	Herbst, vor dem Auflaufen, 2,0 l/ha	
Abstandsauflagen Weitere Auflagen im Tabellenteil	Hang > 2 %:	20 m
	Oberflächengewässer	NW605: 5 m (50 %, 75 %), Länderrecht (90 %), NW606: 10 m
	Saumstrukturen	0 m
Bienenschutz	Nicht bienengefährlich (B4)	
Gebindegröße	10 l	

Successor® 600 – Wirkungsweise

- Successor® 600 ist teilsystemisch und hemmt die Lipidbiosynthese sowie die Zellteilung
- Aufnahme erfolgt über die Wurzeln, das Hypokotyl und Keimblätter der jungen Pflanzen
- Successor® 600 ist bodenaktiv gegen Ungräser und breitblättrige Unkräuter in Raps im Vorauflauf



Quelle: FMC, eigene Darstellung

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.
Stand: 04/2026 Successor® 600 ist eine Marke der FMC Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften



WIRKUNGSSPEKTRUM DER RAPSHERBIZIDE

	Vorauflauf		Nachauflauf		
	Gamit® 36 AMT	**Successor® 600**	**Gajus®**	**Gajus® / Runway™**	**Gajus® + Fuego® Top**
	mit Clomazone	**ohne Clomazone und Metazachlor**	**ohne Clomazone und Metazachlor**		**mit Metazachlor**
Wirkstoffgehalt pro ha	118,8 g Clomazone	1.200 g Pethoxamid	24 g Picloram + 1.200 g Pethoxamid	40 g Picloram + 1.200 g Pethoxamid + 8 g Aminopyralid + 48 g Clopyralid	13,6 g Picloram + 680 g Pethoamid + 498,8 g Metazachlor + 166,3 g Quinmerac
Anwendungszeitpunkt	VA	VA	NA (BBCH 10–14)	NA (BBCH 10–14)	NA (BBCH 10–14)
Aufwandmenge	0,33 l/ha	2,0 l/ha	3,0 l/ha	3,0 / 0,2 l/ha	1,7 + 1,33 l/ha
Unkräuter					
Acker-Hellerkraut	■■■	■■	■■	■■■	■■■ (■)
Acker-Krummhals	■	■■	■■	■■■	■ (■)
Besenrauke, Gemeine	■■■	■■	■	■	■
Ehrenpreis-Arten	■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Erdrauch, Gemeiner	■	■■	■■	■■	■■■
Gänsefuß, Weißer	■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Hundskerbel	■	■	■	■	■ (■)
Hirtentäschel, Gemeines	■■■■	■■■	■■	■■	■■■
Kamille-Arten	■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■ (■)
Klatsch-Mohn	■	■	■■■	■■■■	■■■ (■)
Kletten-Labkraut	■■■■	■	■■■	■■■■	■■■■
Kornblume	■	■	■■	■■■■	■■■■
Rauke, Weg-	■■■■	■	■■	■■	■
Stiefmütterchen-Arten	■	■	■	■■	■ (■)
Storchschnabel-Arten*	■	■■■	■■■	■■■	■■ (■)
Taubnessel-Arten	■■■	■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Vergissmeinnicht, Acker-	■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
Vogelmiere	■■■■	■■■	■■	■■	■■■ (■)
Ungräser					
Ackerfuchsschwanz	■	■	■	■	■■ (■)
Rispe, Einjährige	■	■■■■	■■■	■■■	■■■
Windhalm, Gemeiner	■	■■■■	■■■	■■■	■■■■

■■■■ sehr gute Wirkung ■■■ gute Wirkung ■■ Teilwirkung ■ nicht ausreichende Wirkung

* Anwendung in frühen Stadien (BBCH 10/11)

Quelle: FMC Versuche

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.
Stand: 04/2026 Successor® 600 ist eine Marke der FMC Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften