Sådan bruger du clomazon!

Bemærk, det er kun Centium 36 CS med ny godkendelse, som kan benyttes efter fremspiring. Samt at i det tilfælde, må en samlet dosering på 0,2 l/ha ikke overskrides.

Vær forsigtig med clomazon på stressede planter eller ved risiko for frost!

Nordic Sugar
Member of Nordzucker Group
www.sukkerroer.nu



Er marken hovedsagelig humusjord?

Ja → Ingen behandling med clomazon Jvnf. etikette

Nej → Før fremspiring Kimstængel under 1 cm? (Stadium 07)

Nej → Har roerne mellem 2 og 8 udfoldede blade? (Stadium 12-18)

Nej → Ingen behandling med clomazon Tjek evt. igen når 2 blivende blade

Ja → Er hundepersille et problemukrudt?

Ja → Er marken hovedsagelig lerjord (JB>4)

Ja → 0,15 l/ha + 0,05 l/ha i st 12-18

Nej → 0,10 l/ha + 0,05 l/ha i st 12-18

Nej → Særligt ukrudt? Hundepersille, Burresnerre, Spildraps, Hyrdetaske, Natskygge, Mælde/Hvidmelet gåsefod, Vejpileurt

Nej → Ingen behandling med clomazon

Ja → Er marken hovedsagelig lerjord (JB>4)

Ja → 0,10 - 0,12 l/ha

Nej → 0,05 - 0,06 l/ha

Ja → Er marken hovedsagelig lerjord (JB>4)

Nej → Er der udsigt til kraftig regn indenfor 5 dage

Ja → Ingen behandling med clomazon Tjek skemaet igen ved næste sprøjtning



Ja → Særligt ukrudt? Hundepersille, Burresnerre, Spildraps, Hyrdetaske, Natskygge, Mælde/Hvidmelet gåsefod, Vejpileurt

Nej → Ingen behandling med clomazon

Nej → Har roerne 2 - 3 udfoldede blade? (Stadium 12-13)

Nej → Har roerne 4 - 8 udfoldede blade? (Stadium 14-18)

Ja → 0,03 - 0,05 l/ha Sammen med ukrudtssprøjtning

Ja → 0,05 - 0,10 l/ha Sammen med ukrudtssprøjtning