

Safari® 50 WG

Ukrudtsmiddel



Bekæmper besværlige ukrudtsarter og forstærker effekten mod korsblomstret ukrudt

ROER

REGISTRERINGSNUMMER	11-76		
AKTIVSTOF	500 g/kg triflusaluron-methyl	HRAC gruppe	B
AKTIVSTOF		HRAC & WSSA gruppe	2
FORMULERING	Vanddispergerbart granulat (WG)		
DOSERING	15 g/ha		
EMBALLAGE	120 g		

PRODUKTEGENSKABER:

- Bekæmper besværlige ukrudtsarter i roer
- Forstærker effekten i det samlede program mod raps
- Forstærker effekten på hundepersille
- Letopløseligt granulat
- Blandbart med relevante ukrudtsmidler
- Økonomisk ukrudtsbekæmpelse til roer
- Har både blad- og jordeffekt.

ANVENDELSE

Safari® 50 WG må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer (sukkerroer, foderroer), rødbeder, cikorie og julesalat.

VIRKEMÅDE

Safari® 50 WG optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactase-synthasen (ALS)) blokeres.



ANVENDELSE AF SAFARI® 50 WG

AFGRØDER	DOSIS PR. ha.	TIDSPUNKT	BEMÆRKNINGER
Bederøer, Rødbeder	15 g + 0,5 l Olie	Afgrødens stadium 10-31	1 x 15 g/ha eller 2 x 7,5 g/ha med 7-14 dages interval. Max. 15 g Safari pr. ha pr. sæson. Behandlingsfrist senest 90 dage før høst.
Cikorie, Julesalat	15 g + 0,5 l Olie	Afgrødens stadium 10-39	

EFFEKTABEL SUKKERROER

UKRUDTSART	BEREGNET EFFEKT (%)
BRANDBÆGER, ALM.	89
BURRESNERRE	80
FORGLEMMIGEJ, MARK	89
FUGLEGRÆS	22
FUGLEGRÆS ALS-RES	1
FUGLEGRÆS SU-RES	1
GULURT	89
GÅSEFOD, HVIDMELET	10
HANEKRO	89
HAREMAD	89
HUNDEPERSILLE	87
HYRDETASKE	66
KAMILLE, LUGTLØS	94
KAMILLE, LUGTLØS ALS-RES	1
KAMILLE, LUGTLØS SU-RES	1
KAMILLE, SKIVE	92
KORNBLOMST	63
KÅL, AGER	88
MYNTE, AGER	74
NATSKYGGE, SORT	84
NÆLDE, LIDEN	89
PENGEURT	97

UKRUDTSART	BEREGNET EFFEKT (%)
PILEURT, BLEG	60
PILEURT, FERSKEN	60
PILEURT, SNERLE	60
PILEURT, VEJ	33
RAPS	88
SENNEP, AGER	97
STEDMODER, AGER	10
STORKENÆB	72
TVETAND	26
ÆRENPRIS, MARK	76
ÆRENPRIS, STORKRONET	76
ÆRENPRIS.VEDBEND	76

Kilde: Planteværn Online

Afgrøde	Sukkerroer
Anvendt dosering	15 g/ha Safari® 50 WG
Vækststadie	BBCH 15
Ukrudtets udviklingstrin	3-4 blade

VIRKNING

96-100 %	86-95 %	76-85 %	66-75 %	50-65 %	< 50 % eller ukendt
----------	---------	---------	---------	---------	---------------------