

FMC**Cuadro®
NT****Vækstregulerings-
middel**

Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs mæssigt og kræver gyldig autorisation.

Deklaration:
Trinexapac-ethyl 250 g/l (25 % w/w)
Vækstreguleringsmiddel nr. 11-59

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel forordningen 1107/2009.

Type: Midlet er et emulgerbart koncentrat

Holdbarhed: 2 år

Nettoindhold: 5L

Opbevaring: I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Produktionsdato: Se print på dunken

Producent og

godkendelsesidnehaver:

FMC Agricultural Solutions A/S,
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre
Tel. +45 9690 9690,
www.fmcagro.dk

5L e**FMC**

FMC Agricultural Solutions A/S,
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre
Tel. +45 9690 9690, www.fmcagro.dk

UFI 0E30-C390-0N4R-G7AU**ADVARSEL**

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan forårsage skader på mavearmkanalen ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse (P280).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Indlænd ikke spray (P260).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 39.

Må i frøgræs ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 49.

Halmen fra frøgræs må ikke anvendes til opfodring.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbi passerende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED HÜDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352).

Ved hudirritation eller udslett: Søg lægehjælp (P333 + P313).

Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skyllning (P305 + P351 + P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Søg lægehjælp ved ubehag (P314).

LÆS BRUGSANVISNINGEN



11001431_22054829_DENMARK



130/125 x 135 - 11001431_22054829_LBL_ML-F_5L_CUADRO NT_DK_2_BOOKLET_6pages.indd 1

20/12/2022 14:01

P 032C P 129C **CYAN** MAGENTA YELLOW BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	
Product SKU	11001431	Base for Booklet	
Product SKU Description	CUADRO NT_5L_DK	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22054829	Number of pages (Booklet)	6 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_CUADRO NT_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

BRUGSANVISNING**Godkendelse:**

Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.

Behandlingsrestriktioner:

Må i korn kun anvendes indtil vækststadiet 39 (fanebladet fuldt udviklet).

Må i frøgræs kun anvendes indtil vækststadiet 49.

Halm fra frøgræs må ikke opfodres.

Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel må ikke anvendes ved udsigt til snarlig nedbør eller frost. Undgå behandling på planter, der er så våde, at der er risiko for afløb.

Undgå behandling af planter der er stressede, enten af sygdomme, næringsstofmangel, skadedyr, vandstress, tørke eller frost.

Virkemåde:

Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel er et vækstreguleringsmiddel, der kan anvendes i alle kornarter uanset om det er vårsæd eller vintersæd. Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel kan også anvendes til vækstregulering af frøgræsafgrøder. Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel modvirker lejesæd og sikrer en mere ensartet modning af afgrøden. Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel optages gennem bladene, og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivtstoffet hæmmer stråets strækingsvækst. Trinexapac hæmmer dannelsen af de såkaldte gibbereliner. Gibberelinerne er plantehormoner, der påvirker længdevæksten af de enkelte celler i planten. Hæmningen af længdevæksten resulterer i et tykkere og stærkere strå.

Optimale virkningsforhold:

Der må kun vækstreguleres på planter der er i god vækst. Optimale behandlingstemperaturer er fra 10 °C. Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel kan udsprøjtes ved temperaturer ned til 8 °C.

Regn: Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel er regnfast efter 3 timer.

Table 1: Brugsanvisning:

Må kun bruges til vækstregulering af landbrugsafgrøder			
Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides. Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel må kun anvendes på afgrøder i god vækst.			
Afgrøde	Formål	Dosering l/ha	Bemærkninger
Vinterhvede BBCH 30-39	Vækstregulering	0,2-0,4	Anvend 0,2 - 0,4 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel i strækingsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blodstråede sorter.
Vårhvede BBCH 30-39	Vækstregulering	0,2-0,4	Anvend 0,2-0,4 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel i strækingsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blodstråede sorter.
Vinterbyg BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Anvend 0,4 - 0,6 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel i strækingsfasen. I år med øget risiko for lejesæd, og i blodstråede sorter, anvendes 0,6 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel
Vårbyg BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Anvend 0,4 - 0,6 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel i strækingsfasen. Højeste dosis ved højt N-niveau og blodstråede sorter.

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	
Product SKU	11001431	Base for Booklet	
Product SKU Description	CUADRO NT_5L_DK	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22054829	Number of pages (Booklet)	6 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_CUADRO NT_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Havre BBCH 30-34	Vækstregulering	0,3	Anvend 0,3 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel i strækingsfasen. Havre må aldrig behandles senere end stadiet 34.
Rug BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Rug er den mest bløddråede kornart. Anvend 0,4-0,6 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel i strækingsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og bløddråede sorter.
Triticale BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Anvend 0,4 - 0,6 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel i strækingsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og bløddråede sorter.
Græsfrøafgrøder			
Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel må kun anvendes på afgrøder i god vækst. Afgroderne må ikke være påvirkede af frost, tørke eller generelt dårlig vækst.			
Afgrode	Formål	Dosering l/ha	Bemærkninger
Almindelig røjgræs BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Anvend 0,4- 1,2 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel i kraftige røjgræsmarker. Højeste dosering anvendes i kraftigt gødede marker. Tetraploide sorter har kraftigere vækst end diploide.
Italiensk røjgræs BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Anvend 0,4- 1,2 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel i kraftige røjgræsmarker. Højeste dosering anvendes i kraftigt gødede marker. Tetraploide sorter har kraftigere vækst end diploide.
Rødsvingel BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Anvend 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel i rødsvingel fra ultimo april frem til medio maj. Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel kan evt. blandes med et CCC-produkt
Strandsvingel BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Anvend 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel i strandsvingel fra ultimo april frem til medio maj. Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel kan evt. blandes med et CCC-produkt
Timothe BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Vækstreguleringen foretages fra begyndende strækingsvækst når 1. knæ er synligt. Anvend 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel
Hundegræs BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Vækstregulering foretages fra begyndende strækingsvækst først i maj, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel
Øvrige frøgræs- afgrøder BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Vækstregulering foretages fra begyndende strækingsvækst først i maj, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4- 1,2 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	
Product SKU	11001431	Base for Booklet	
Product SKU Description	CUADRO NT_5L_DK	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22054829	Number of pages (Booklet)	6 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_CUADRO NT_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Hvis der i samme vækstsæson anvendes andre produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne omregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser (N) i den pågældende afgrøde.
 Eksempel: Hvis der i frøgræs er anvendt 0,6 l/ha Cuadro NT, svarende til 0,5 N, må der efterfølgende kun anvendes en dosering svarende til 0,5 N af andre produkter indeholdende trinexapac.

Triazolol kan have vækstregulerende effekt i kornafgrøder. Ved blanding med triazolol kan man derfor reducere doseringen med ca. 20%. Der skal dog blandes med en dosering på minimum 0,3 l/ha Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Forlad det farlige område.

Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.

Hvis det indåndes:

Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.

Søg læge ved vedvarende symptomer.

I tilfælde af hudkontakt:

Hvis på beklædning, fjern beklædning.

Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.

Vask med sæbe og vand.

Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

I tilfælde af øjenkontakt:

Skyl omgående øjnene med rigeligt vand.

Fjern kontaktlinser.

Beskyt det ubeskadigede øje.

Hold øjet vidt åbent under skylningen.

Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Ved indtagelse.:

Hold luftveje frie.

Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.

Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

Søg læge ved vedvarende symptomer.

Bring straks den tilskadekomne på sygehus.

Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn.

Tilberedning af sprøjtevæsken:

Sprøjtebeholderen skal være renjort før Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel fyldes i. Fyld 75% af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præperatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel skal udbringes.

Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:

- 50 m. fra almen vandforsyning til drikkevandsformål.

- 25 m. fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål.

- 50 m. fra overfladevand (vandløb, søer, kystvand) og § 3 -naturbeskyttelsesområder.

Påfyldning på arealer hvor Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel udbringes, må ikke ske nærmere end:

- 300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og

- 50 m fra overfladevand(vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3 -naturbeskyttelsesområder.

Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	
Product SKU	11001431	Base for Booklet	
Product SKU Description	CUADRO NT_5L_DK	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22054829	Number of pages (Booklet)	6 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_CUADRO_NT_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Sprøjteteknik:

Ved udbringning af Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel bør midlet opblandes med en vandmængde på mellem 150 og 200 l vand/ha, afhængig af afgrødens størrelse. Den højeste vandmængde bruges hvor der er brug for afsætning af produkt ned i tætte afgrøder. Den laveste mængde bruges tidligt på vækstsæsonen i forholdsvis små afgrøder. For at opnå god vækstregulerende effekt, er det vigtigt, at produktet fordeles jævnt på alle blade. Overlap og afdrift bør undgås.

Under normale vindforhold anbefales det, at anvende en 02 eller 025 low drift dyse. I nedenstående ses en oversigt over disse dysers ydelser ved varierende tryk og hastighed.

Eksempler på vandmængder ved brug af 02 og 025 dysen ved forskelligt tryk og kørehastighed.

Dyse	Tryk (2-4 bar)	Km/t (max. 8-10 km/t)	Vandmængde, l/ha
02/025	3,5	6	175/220
02/025	2,5	6	150/180
02/025	2,5	8	110/140
02/025	2,0	8	100/120

Rengøring af sprøjte:

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Det maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.

1. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
2. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL Clear® Extra rengøringsmiddel Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
3. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL Clear® Extra rengøringsmiddel pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.
4. Sprøjten fyldes igen med 10-15% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal.

Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.

Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.**Bortskaffelse af tom emballage:**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	
Product SKU	11001431	Base for Booklet	
Product SKU Description	CUADRO NT_5L_DK	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22054829	Number of pages (Booklet)	6 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_CUADRO NT_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Opbevaring og holdbarhed:

I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed. Midlet må kun opbevares i originalemballagen

Tankblanding:

Nedenstående blandingspartnere kan tankblandes med Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel. Ved tankblanding med Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel skal blandingspartnerens etiketteforskrifter følges. Bland aldrig Cuadro® NT vækstreguleringsmiddel med mere end et produkt plus evt. spredeklæbemiddel.

Midler til vækstregulering: Chlormequat-chlorid (CCC)- og ethephon-holdige midler

Midler mod skadedyr: Gamma-cyhalothrin-, lambda-cyhalothrin-, tau-fluvalinat-, og pirimicarb holdige midler

Midler mod svampesygdomme: prothioconazol-, tebuconazol-, azoxystrobin-, metrafenon-, pyraclostrobin-, og metconazol-holdige midler.

Midler mod ukrudt: tribenuron-methyl-, metsulfuron-methyl-, fluroxypyr- og florasulam-holdige midler.

Der bør ikke blandes med produkter, der indeholder aktivstoffet iodosulfuron eller mangansulfat.

Registrerede varemærker:

FMC, FMC logo, Cuadro NT, All Clear are trademarks of FMC Corporation and/or its affiliates

© 2022 FMC Corporation. All rights reserved.

130/125 x 135 - 11001431_22054829_LBL_ML-F_5L_CUADRO NT_DK_2_BOOKLET_6pages.indd 6

20/12/2022 14:01

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	
Product SKU	11001431	Base for Booklet	
Product SKU Description	CUADRO NT_5L_DK	Booklet	130/125 x 135 mm
Label SKU	22054829	Number of pages (Booklet)	6 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_5L_CUADRO NT_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	