

FMC

SAFARI® 50 WG

Ukrudsmiddel

GRUPPE 2 HERBICID

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I BEDEROER, RØDBEDER, CIKORIE OG JULESLAT.

Ukrudsmiddel, nr. 11-76
Omfattet af Miljøministeriets
bekenktgørelse om
bekæmpelsesmidler samt
plantebeskyttelsesmidlerforordningen
1107/2009.

Analyse: Triflusalufuron-methyl
(CAS nr 126535-15-7)
500 g/kg (50% w/w)

Midlet er et vandopløsligt granulat

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun
købes af professionelle og anvendes
erhvervsomt og kræver gyldig
autorisering.

**Opbevares tørt og køligt.
Se vedlagte brugsanvisning.**

Inhold: **120g** e

* Varemærke tilhører FMC Corporation
eller tilknyttede selskaber

**Registreringsindehaver
og producent:**

FMC Agricultural Solutions
A/S
Thyborønvej 78 -
7673 Harboøre -
Telefon 96909690
www.fmcagro.dk

Batchnummer og
produktionsdato, se
andetsteds på emballagen

Holdbarhed: Produktet
er holdbart mindst 2 år fra
produktionsdato.

Opbevares i original, tæt
lukket emballage, køligt
og frostfrit, beskyttet mod
direkte sollys og andre
varmekilder.

UFI: U9AX-E254-DN41-T27E

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Forsårsger alvorlig øjenskade (H318). Mistænkt for at fremkalde kræft (H351). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad. *Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.* **Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, cikorie og julesalat. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end i vækststadium 11-31. Må i julesalat og cikorierødder ikke anvendes senere end i vækststadium 11-39. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtedyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder triflusalufuron-methyl ikke anvendes tidligere end i brugsanvisningen angivne vækststadier (Spe1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



Batchnummer: / Produktionsdato:



11005253_22056525_DENMARK

155/150 x 70 - 11005253_22056525_LBL_ML-F_120G_SAFARI 50WG_DK_2_BOOKLET_8pages_LEFT.indd 1

25/05/2023 11:23

P 032C P 2408C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

	FILL IN	DIMENSIONS (WXH)	
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11005253	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI 50DF_120G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056525	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI 50WG_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22046633	Preprinted Material	

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Ved kontakt med øjener: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Førsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge(P305+P351+P338+P310).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P373+P313).

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer.

Nødtelefon: Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82121212.

BRUGSANVISNING**Generel information**

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer, rødbeder, cikorie og julesalat.

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel hører til sulfonylurea-herbiciderne, der virker ved at hæmme dannelsen af de essentielle aminosyrer isoleucin, leucin og valin i planternes vækstpunkter.

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel virker hovedsagelig som bladmiddel på fremspirende tokimbladet ukrudt; men der foregår også nogen rodoptagelse fra jorden.

Ukrudtsplanternes vækst standses inden for få timer efter behandlingen. Synlige symptomer, gulfarvning og senere døde skudspidser, ses først efter 1-2 ugers forløb.

Undgå altid vinddrift til læhegn, naboafgrøder eller marker, hvor der skal dyrkes andet end bederoer, rødbeder, cikorie, eller julesalat. Ærter er specielt følsomme over for Safari® 50 WG ukrudtsmiddel.

Klima

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel virker bedst ved høj relativ luftfugtighed og når temperaturen er over 12°C. Afgrøden skal være sund og i god vækst.

Behandling i perioder med nattefrost eller temperaturer under 9°C frarådes, da der på kulde-stressede roer er risiko for kortvarig væksthæmning af afgrøden.

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel må først udspørges 2-3 dage efter en frostperiode, når afgrøden igen er i god vækst.

Midlertidig vækststandsning kan optræde ved udspørgning på dage med store temperaturudsving, d.v.s. udsving på mere end 15°C mellem dag- og nattemperatur. Gulfarvning/marmorering kan forekomme ved temperaturer over 22-24°C. Symptomerne ses inden for den første uge efter behandlingen, og er hyppigst regkommende efter 3. spørgning.

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel bør ikke udspørges, hvis der ventes regn inden for 4 timer, da effekten på ukrudtet kan forringes ved afvaskning af produktet. Det frarådes at udspørgte Safari® 50 WG ukrudtsmiddel hvis der er udsigt til kraftig nedbør efter behandlingen. Specielt i forbindelse med meget lave temperaturer, kan regnmætret kold jord hæmme afgrødernes vækst og derved øge risikoen for stress.

Midlertidig vækststandsning eller gulfarvning har ikke vist negativ effekt på udbyttet.

BLACK



	FILL IN	DIMENSIONS (WXH)	
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11005253	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI 50DF_120G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056525	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI 50WG_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22046633	Preprinted Material	

Begrænsning i anvendelse

Maks. total dosering: 15 g Safari® 50 WG ukrudtsmiddel pr. ha per år.

Omsåning og efterfølgende afgrøde

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel nedbrydes hurtigt i jorden og der er derfor kun lille sandsynlighed for negativ påvirkning af en efterfølgende afgrøde. Inden der sås ny afgrøde skal jorden behandles i henhold til normal god praksis. Se endvidere en eventuel blandingspartners etikette.

Omsåning

Hvis en behandlet mark skal omsås, må der indenfor 4 måneder efter behandling med Safari® 50 WG ukrudtsmiddel kun sås sukkerroer, foderroer, rødløber, vårbyg eller linser, forudsat det er i overensstemmelse med en eventuel blandingspartners etikette.

I tilfælde af at en cikorie eller julesalat skal sås om, så gælder der, baseret på nuværende viden, at kun sukkerroer kan sås indenfor 4 måneder efter en behandling med Safari® 50 WG ukrudtsmiddel, forudsat det er i overensstemmelse med en eventuel blandingspartners etikette.

Efterfølgende afgrøde

Kun korn kan sås i sammen kalenderår. Det følgende år er der ingen begrænsninger i hvad der kan sås, forudsat det er i overensstemmelse med en eventuel blandingspartners etikette.

Plantning / Såning af blomster, buske, træer eller anden specialafgrøde skal dog ikke ske indenfor 12 måneder fra en Safari® 50 WG ukrudtsmiddel behandling.

Virkningspektrum

Når brugsanvisningen følges, har Safari® 50 WG ukrudtsmiddel følgende ukrudtseffekt under forudsætning af, at der anvendes 2 sprøjtninger og at ukrudtet har max. 2 løvblade (se også under anvendelse):

Effektiv virkning:

Ager-Sennep	Haremad	Liden Nælde
Alm. Pengeurt	Kamille arter	Mark-Forglemmigej

God virkning:

Ager-Tidsel (<i>frøfremspiret</i>)	Fersken Pileurt	Raps
Bleg Pileurt	Hanekro arter	Sort Natskygge
Burresnerre	Hyrdetaske	Storkronet Ærenpris

Svag virkning:

Hundepersille	Rød Tvetand	Vej-Pileurt
		Vortemælk arter

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11005253	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI 50DF_120G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056525	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI 50WG_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22046633	Preprinted Material	

Anvendelse - Bederoer, rødbeder, cikorie og julesalat

Sammenlæg af de godkendte anvendelsesområder der gælder for Safari® 50 WG ukrudtsmiddel.

Afgrøder	Tilladt behandling			Anmærkninger	
	Tidpunkt udv. Anmærkninger stadium	Karenstid	Max antal beh.		
BEDEROER (Sukkerroer, Foderroer), RØDBEDER	BBCH 11-31	90 dage	1-2 7-14 dages interval	1 x 15 g/ha Eller 2 x 7,5g/ha	Dosen skal tilpasses i henhold til brugsanvisningen nedenfor.
CICORIE JULESALAT	BBCH 11-39	90 dage	1-2 7-14 dages interval	1 x 15 g/ha Eller 2 x 7,5g/ha	Dosen skal tilpasses i henhold til brugsanvisningen nedenfor.

Maksimal total dosering: 15 g Safari® 50 WG ukrudtsmiddel pr. ha pr. år.

Optimal behandling af ukrudtet er når det nyfremspirede ukrudt har kimblad - 2 blade.

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel udbringes optimalt som splitdosering, 2 x 7,5g Safari® 50 WG ukrudtsmiddel /ha i program. Programmet tilpasses den enkelt marks ukrudtsflora.

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel kan ofte med fordel udbringes alene med non-ionisk sprede-/klæbemiddel, som en 3. og/eller 4. behandling til bekæmpelse af sen og langstrakt fremspiring af tokimbladet ukrudt, som f.eks. hundepersille, raps, agersennep, burreseer og kamille. Dosering er da 15g Safari® 50 WG ukrudtsmiddel/ha.

Hvidmelet gåsefod, snerle-pileurt, kamille, alm. fuglegræs og andre betydende arter bekæmpes bedst i et program hvor der anvendes flere typer ukrudtsmidler. Safari® 50 WG ukrudtsmiddel tankblandes med et phenmedipham-holdigt produkt og evt. et produkt indeholdende metatriton. Forøget effekt på især snerle-pileurt opnås ved blanding med ethufumesat-holdigt middel.

Længerevarende ukrudtseffekt, specielt ved stor bestand af kamille og hvidmelet gåsefod, opnås ved tilsætning af metatriton-holdigt produkt.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11005253	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI 50DF_120G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056525	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI 50WG_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22046633	Preprinted Material	

Ukrudt i roer bekæmpes normalt med tre udsprøjtninger fra roernes 2 blad stadiet til begyndende lukning af rækkerne, BBCH 12-32:

Første gang: Når det første fremspirede ukrudt er på kimbladstadiet. Burre-snerre skal have min. 1 krans og max. 3 krans. Raps bekæmpes op til 2 bladstadiet.

Anden gang: Når nyfremspiret ukrudt er på kimbladstadiet, normalt 6-8 dage efter.

Tredie gang: Når nyfremspiret ukrudt er på kimbladstadiet, normalt 10-14 dage efter anden sprøjtning.

Spredte-klæbemidler og olier

Spredte/klæbemidler:

F.eks. Swedane contact®.

Dosering: 100 ml/100 liter vand.

Olie

Mængden af olie varierer efter den valgte type, se etiketten for det valgte produkt. Der anvendes normalt 0,5 l olie hvis der anvendes en olie, f.eks. Renol, Sun Oil 33E eller Super olie.

Blandinger med andre midler

Græsukrudtsmidler bør udbringes separat, da deres effekt forringes ved blanding med andre roeukrudtsmidler.

Resistens

Virkemådegruppe:

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel indeholder triflusaluron-methyl som tilhører virkemådegruppe **HRAC gruppe 2 (tidligere B)**.

Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende.

Hvis en ukrudtsart er resistent overfor et sulfonylurea produkt fra HRAC gruppe 2 (tidligere B), er der krydsresistens overfor andre midler med samme virkemåde. Der er fundet flere tilfælde af resistens over for sulfonylurea-midlerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue, lugtløs kamille, enkelte tilfælde af hydrataske, hanekro og gul okseøj, vindaks, samt flere tilfælde af agerævehale.

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel har ingen effekt overfor f.eks. alm. fuglegræs, hvorved en manglende bekæmpelse således ikke i sig selv er udtryk for resistens.

Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med effektiv virkning over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjtne en tankblanding af midler med forskellige virkemåde. Safari® 50 WG ukrudtsmiddel udbringes normalt i blanding med andre produkter med en anden virkemåde.

Anbefalinger

1. Der bør holdes et godt sædskifte.
2. Når sulfonylurea produkter anvendes i andre afgrøder i sædskiftet, bør disse anvendes efter de på etiketten nævnte anbefalinger, dvs. i program med midler som indeholder anden virkemådegruppe med effekt på relevante ukrudtsarter.
3. Tankblanding med andre roe-ukrudtsmidler vil normalt reducere risikoen for resistensdannelse.

Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjtforhold. Blanding med phenmedipham-holdigt produkt vil effektivt bekæmpe alm. fuglegræs m.fl.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11005253	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI 50DF_120G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056525	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI 50WG_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22046633	Preprinted Material	

Sprøjeteknik og vandmængde

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel skal udbringes med en bomsprøje, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøje skal anvendes præparatfyldestyret eller udstyr til direkte injektion. Hvis der bruges anden sprøjeteknik, f.eks Danfoil, følges vedkommende vejledning.

For at sikre en optimal optagelse og effekt, udsprøjt Safari® 50 WG ukrudtsmiddel altid med tilsætning af et spredde/klæbemiddel eller en olie. Ved blanding med andre roemidler følges anbefaling for tilsætning af olie af disse stoffers etikette.

Km/t	Tryk, bar	ISO 025 dyse	ISO 030 dyse	ISO 040 dyse
		l/ha		
6	2	160	190	260
	2,5	180	220	290
	3,5	215	260	350
8	2	120	145	195
	2,5	135	160	220
	3,5	160	190	260
10	2	100	115	160
	2,5	110	130	175
	3,5	130	155	205

Bemærk at afstandskravet til vandmiljøet kan nedsættes ved brug af anerkendt adriftsreducerende sprøjteudstyr (jf. Miljøstyrelsens seneste vejledning: Brug af adriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plantebe-skyttelsesmidler på mst.dk), som indeholder oplysninger om hvilke krav, der stilles til udstyret, og hvordan man beregner det reducerede afstandskrav. Husk at det skal dokumenteres, hvis der anvendes adriftsreducerende udstyr til at nedsætte afstandskravet.

Tilberedning af sprøjtévæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtévæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Påfyldning

Safari® 50 WG ukrudtsmiddel doseres via præparatfyldestyret.

Husk:

Efterfølgende skylles præparatfyldestyret, samt evt. tomme dunke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Safari® 50 WG ukrudtsmiddel i fyldestationen.

Spredemiddel/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjstens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjt under kørsel på det behandlede areal.

BLACK



	FILL IN	DIMENSIONS (WXH)	
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11005253	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI 50DF_120G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056525	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI 50WG_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22046633	Preprinted Material	

Renngøring af sprøjtedyr efter Safari® 50 WG ukrudtsmiddel

Efter endt sprøjtarbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet (svarende til 10-15% af tankens kapacitet), således, at restsprøjtbevæskan kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtbevæskan skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjttes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i 3 skyllinger/vaske, hvor tanken tømtes helt imellem hver skylning/vaske. Rengøring foretages med All Clear® Extra rengøringsmiddel (se efterfølgende vejledning). Der henvises endvidere til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler.

BEMÆRK! Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømtes helt for sprøjtbevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca 1/3 af det rene vand. Skyllvandet sprøjtes udover den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter All Clear® Extra rengøringsmiddel. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.

4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømtes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear® Extra rengøringsmiddel pr. 10 liter vand.

Bortskaffelse af tom emballage og rester.

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllvandet hældes op i sprøjtbevæskan.

Emballagen må ikke bruges.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11005253	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI 50DF_120G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056525	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI 50WG_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22046633	Preprinted Material	

FORHOLDSREGLER

Ifølge Beskæftigelsesministeriet bekendtgørelse om unge menneskers farlige arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: «Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler».

- **ved fremstilling af sprøjtetvæskan anvendes:** Handsker (nitril), støvler, beskyttelsesbriller, forklæde. Ved længere tids eksponering anvendes også halvmaske med partikelfilter FFP2 (EN149).
- **ved udbringning anvendes:**
Marksprøjte - lukket førerhus (spredetøm på traktor, bom < 1 m over jordoverfladen): Handsker (nitril), støvler, sikkerhedsbriller, beskyttelsesdragt med hætte samt halvmaske med partikelfilter FFP2. Ved lukket førerhus anvendes respirationsudstyr, beskyttelsesbriller, beskyttelsesdragt og handsker kun udenfor førerhuset.
Marksprøjte - åbent førerhus (spredetøm på traktor, bom < 1 m over jordoverfladen, tryk < 3 bar): Handsker (nitril), støvler, beskyttelsesdragt med hætte samt helmaske med partikelfilter FFP2.

BRAND

Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der eventuelt er andre farlige stoffer som f.eks. gødning.
 Passende slukningsmidler: CO₂, pulver, vandtåge eller skum. Afkøl beholdere/tanke med vandtåge.
 Anvend så lidt vand som muligt og undgå, at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.

Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/damp da den indeholder carbon oxidier, nitrogen oxidier, hydrogenfluorid og svovl dioxid. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.
 Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

SPILD

Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politiet.

Spild fejles sammen og opsamles sammen med evt. forurenede jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Ved håndtering af produkt og forurenede jord anvendes handsker, støvler, forklæde samt halvmaske med partikelfilter FFP2.

FMC, FMC logo, Safari, All Clear are trademarks of FMC Corporation and/ or its affiliates © 2022 FMC Corporation. All rights reserved.
 www.fmcagro.dk

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11005253	Base for Booklet	
Product SKU Description	SAFARI 50DF_120G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056525	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_120G_SAFARI 50WG_DK_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22046633	Preprinted Material	