FMC

راجبى ١٠٪ محبب

RUGBY 10% G

مبيد نيماتودى

الاسم الكيميائى

S,S-di-sec-butyl O-ethyl phosphorodithioate

التركيب

مادة فعالة : كادوسافوس (**CADUSAFOS**)	١٠٪	(وزن/وزن)
مواد حاملة	٩٠٪	(وزن/وزن)
أجمالى	١٠٠٪	

المستحضر فى صورة حبيبات يحتوى الكيلو جرام منه على ١٠٠ جرام مادة فعالة كادوسافوس

ضـــــار

مادة سامة و يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال
العقار المضاد في حالة التسمم
سلفات الاتروبين و تحت إشراف الطبيب

الشركة المنتجة : أف أم سى المكسيك
الشركة المحلية : شركة دالتا
١٧ مكرر شارع الحجاز ـ المهندسين ـ الجيزة
تليفون : ٣٣٤٦٠٥٢١ / ٠٢ فاكس : ٣٣٤٦٤٩٣٠ / ٠٢

الشركة المستوردة:
شركة مصر للتنمية الزراعية (هشام أبو حسين)
ك ٨٩ طريق مصر الاسكندرية الصحراوى مدينة السادات
ص.ب. ٩٨ تليفون : ٠٤٥/٩١٦٥٣٣١ & ٠٤٥/٩١٦٥٣٣٢
فاكس ٢٦٠١٨٥٤ /٠٤٨

الاستعمال طبقا لتوصيات وزارة الزراعة

١ – يستخدم **راجبي ١٠ ٪ G محبب** لمكافحة نيماتودا تعقد الجذور فى الموز بمعدل ٤٠ جرام لكل جورة (إلام + الخلفة) مقسمة على دفعتين (٢٠جم + ٢٠جم) بينهما أربعة شهور بداية من شهر مارس على أن تروى الارض مباشرة بعد المعاملة .

٢ – يستخدم **راجبي ١٠ ٪ G محبب** لمكافحة نيماتودا التدهور البطىء فى الموالح بمعدل ٢٤ كجم للفدان وذلك نثرا على سطح التربة حول الاشجار وذلك خلال شهرى فبراير ومارس على أن تروى الارض مباشرة بعد المعاملة .

٣ ـ يستخدم **راجبي ١٠ ٪ G محبب** لمكافحة الأمراض النيماتودية في الزراعات المحمية (الصوب) بمعدل ٥ جرام لكل متر مربع من مساحة الصوبة عند الزراعة على أن يتم الرى مباشرة بعد المعاملة .

فترة ما قبل الحصاد (PHI)

الموز : صفر يوم
الموالح : ١٠٠ يوم من المعاملة
الخيار زراعات محمية (الصوب) : آمن عند الحصاد

الضمـــــان

تضمن الشركة المادة فى عبواتها الاصلية المغلقة وتحت ظروف التخزين المناسبة لمدة سنتان من تاريخ الإنتاج و لا تتحمل الشركة مسئولية أيه أضرار تنتج عن سوء التطبيق والاستخدام والتخزين .

تاريخ الإنتاج: : **Production date**
الصلاحيـة : عامان من تاريخ الانتاج
رقم التشغيلة: : **Batch number**
رقم اللوط: : **Batch number**
رقم التسجيل المحلى : ٥٩٤
سعة العبوة : **عشرة كيلو جرام**

بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب : -

للأنسان وحيوانات المزرعة : -

إبتلاع المبيد خطر ويجب عدم ملامسة المبيد للأعين والملابس يجب غسل الملابس الملوثة بالمبيد قبل العودة الى أرتدائها .

للبيئة : -

هذا المبيد سام للأسماك والحيوانات البرية لذلك يستخدم بحرص فى الاماكن الموجود بها أسماك أو حيوانات برية .

طريقة الحفظ والتخزين : -

لا يستعمل المبيد أو يحفظ بالقرب من الحرارة المباشرة كما لا يحفظ المبيد بالقرب من المأكولات أو المشروبات بل يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال فى عبوته الاصلية فقط محكمة الغلق على أن يتم التخرين فى مكان مظلل وجاف ومعتدل الحرارة .

فى حالات التسمم يجب الاتصال بمراكز السموم الاتية :

المركز القومى للسموم جامعة القاهرة : ٢٣٦٤٠٤٠٢ / ٠٢ & ٢٣٦٤٣١٢٩ / ٠٣

مركز السموم الاكلينيكى جامعة عين شمس : ٢٤٣٤٦٠٩٤ / ٠٢ & ٠٢٢٤٣٤٦٧٨٩

مركز السموم قسم الطب الشرعى جامعة الاسكندرية : ٤٨٦١٨٦١ / ٠٣ & ٤٨٦٢٢٤٤ / ٠٣

إحتياطات الامان و الاسعافات الاولية :

إذا ظهرت أعراض بسيطة للتسمم على الرغم من الاحتياطات الوقائية بادر الى إبعاد العامل عن مكان التلوث وتأكد أن هذه االحالة لابد وأن تزول خلال فترة تتراوح بين ساعة الى أربعة ساعات أما فى حالة التقيؤ فالعلاج يقتصر على إعطاء المصاب حقنة تتألف من ٢ ملليجرام من سلفات الاتروبين فى الوريد أو العضل .

فى حالة التناول عن طريق الفم .

أشرب١ : ٢ كوب ماء مع محاولة التقيؤ ويستدعى الطبيب .

فى حالة الاستنشاق .

ينقل المصاب بعيدا عن مكان الرش ويستدعى الطبيب .

فى حالة تلوث العين والجلد .

الغسيل الجيد بالماء و الصابون لمدة ١٥ دقيقة .

كيفية التخلص من العبوات الفارغة :

يراعى عدم إستخدام العبوات الفارغة فى تخزين أى أطعمة أو مشروبات بل يراعى التخلص منها مباشرة بعد الاستخدام وذلك بدفنها فى الاماكن المخصصة لذلك .

5 703265 563031 >