

Copper 435

Suspensión de abono a base de Cobre (Cu)

Anión mineral: oxiclورو

Para aplicación foliar

Suspensión Concentrada (SC)

Contenido:

Cobre (Cu) soluble en agua 19% p/p (25,3% p/v)

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad.

No sobrepasar las dosis recomendadas

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido: 6,65 kg (5 L)

Lote y fecha de fabricación: véase marcado impreso.

FMC y el logo de FMC son marcas registradas de FMC Corporation y/o sus filiales. FMC Corporation. Todos los derechos reservados.

Importado en UE por FMC Agricultural Solutions A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harbøre, Dinamarca. TEL: 45 (0) 96909690



Fertilizante utilizable en
producción vegetal ecológica
según RCE 2018/848 conforme
a la Norma UNE 142500

Fabricado por:
FMC Agro Limited,
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH.
Reino Unido.
Tel:+441244537370, www.fmc-agro.co.uk.

Distribuido por:
FMC Agricultural Solutions S.A.U.,
Pso. de la Castellana, 257, 5º planta
28046-Madrid-ESPAÑA.
[Tel:+34 915 53 01 04](tel:+34915530104), www.fmcagro.es

CARACTERÍSTICAS

El abono **Copper 435** es una suspensión concentrada. Contiene un sistema humectante/ surfactante para una cobertura y absorción óptimas de las hojas. Contiene 253 g/l de cobre, (equivalente a 422 g/L de Oxidocloruro de Cobre). Incluye un avanzado coformulante con mayor poder surfactante para una mejor absorción y cobertura óptima de la hoja.

Formulación

El cobre es esencial para que los cultivos estimulen los sistemas enzimáticos en asociación con otros elementos y es particularmente activo en muchas de las vías metabólicas dentro en la célula. Todos los cultivos pueden verse afectados por la carencia de cobre: cereales, olivo, viña, cítricos, hortícolas, frutales, tubérculos y pastizales. Los cultivos en suelos de turba, calizas orgánicas poco profundas, brezales y suelos muy lixiviados, son los más propensos a presentar deficiencia de cobre.

DOSIS Y CONDICIONES DE USO

Puede aplicarse en cualquier cultivo que muestre signos de carencia de cobre. Los síntomas varían dependiendo del cultivo, normalmente comienzan por enrollamiento y una leve clorosis y dentro de las zonas cloróticas pueden formarse pequeños puntos necróticos. A medida que los síntomas progresan, las hojas nuevas son más pequeñas, pierden brillo y se marchitan.

Aplicar a las siguientes dosis con un gasto de al menos 200 L de agua por ha:

- Poca deficiencia: 0,25 - 0,5 L/ha.
- Deficiencia moderada: 0,5 - 1 L/ha.
- Deficiencia severa: 0,5 - 1 L/ha. Repetir después de 3-4 semanas y otra vez si los síntomas continúan.

Se recomienda consultar a su asesor para ajustar las recomendaciones a la situación específica para evitar un exceso de fertilización.

Sólo debe utilizarse cuando exista una necesidad reconocida. No superar las dosis adecuadas.

Nota: Se recomienda utilizar los resultados de los análisis del suelo y de los tejidos siempre que sea posible para orientar las aplicaciones de micro y macronutrientes para optimizar el estado de los nutrientes en los cultivos.

No aplicar este producto con luz solar muy intensa o con temperaturas superiores a 25°C. Si es posible, pulverizar por la noche o temprano por la mañana para obtener los mejores resultados. Evitar aplicaciones en condiciones de muy baja humedad o sequía.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar bien el envase antes de abrirlo y utilizarlo. El equipo de pulverización debe estar limpio. Llene el tanque de pulverización con agua hasta la mitad, comience a agitar y añadir la cantidad necesaria de abono **Copper 435**. Aclarar el recipiente a fondo, añada el agua del enjuagado al depósito de pulverización, complete el llenado y aplíquelo sin demora. Mantener la agitación durante todo el proceso. Limpiar bien el pulverizador después del uso.

COMPATIBILIDAD

El abono **Copper 435** es física y químicamente compatible con una amplia gama de productos fitosanitarios. Póngase en contacto con la empresa o con su distribuidor para obtener recomendaciones más específicas (www.fmcagro.es).

UFI: 0JV0-T07X-6008-DD0T



ATENCIÓN



H302. Nocivo en caso de ingestión.

H410. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos

P102. Manténgase fuera del alcance de los niños.

P264. Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P273. Evitar su liberación al medio ambiente.

P301 + P312 + P330: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Enjuagar la boca.

P391. Recoger el vertido.

P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

EUH 208: Contiene 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

Contiene: trihidroxicloruro de dicobre; etanodiol

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO RECOMENDADAS DE ESTE PRODUCTO FERTILIZANTE.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Proteger de las heladas. Almacenar a una temperatura de más de 5°C.

Conservar en un almacén adecuado, fresco y bien ventilado.

No almacenar a la luz directa del sol o cerca de fuentes directas de calor.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.

No reutilizar el envase.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo



GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua del lavado al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.