

Blagal®

Fungicida

Granulado dispersable en agua (WG)

GRUPO	7+11	FUNGICIDA
-------	------	-----------

Composición:

Piraclostrobin..... 6,7% p/p (67 g/kg)

Boscalida..... 26,7% p/p (267 g/kg)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitarios con el número 23.977.

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

N.º de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Registrado por:

BASF Agricultural Solutions Spain SLU, Can Rabia 3-5, plta.5, 08017 Barcelona, Tel. 93 496 40 00

Contenido neto:

5 kg

FMC, y el logo de FMC son marcas comerciales de FMC Corporation y/o sus filiales. ©FMC Corporation. Todos los derechos reservados.

® = Marca registrada de BASF

Distribuido por:

FMC Agricultural Solutions, S.A.U.

Pº de la Castellana nº 257 5º

28046 Madrid – Tel. 915530104

www.fmcagro.es

UFI 6913-XCYJ-V002-6JJG



ATENCIÓN

H361d Se sospecha que puede dañar al feto.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P405 - Guardar bajo llave.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P263 Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, si la persona está consciente, provoque el vómito y no administre nada por vía oral.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede provocar:

Irritación de ojos y piel.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON ESTE PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO

O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 915 620 420.

En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).



MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 30 m o 15 m con boquillas de reducción de deriva del 50% para arándano, grosella, frambuesa y zarzamora.
- 10 m para tomate, pimiento, berenjena, apio, alcachofa, coliflor, canónigo, berro (mastuerzo), barbarea, rúcula, mostaza china, brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica), achicoria y diente de león al aire libre.
- 5 m para el resto de cultivos al aire libre.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

Seguridad del aplicador:

Aire libre: En lechuga, escarola, tomate, pimiento, berenjena, apio, alcachofa, coliflor, canónigo, berro (mastuerzo), barbarea, rúcula, mostaza china, brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica), achicoria, diente de león, hierbas aromáticas y flores comestibles, laurel, zanahoria, cebolla, ajo, frambuesas, zarzamora, arándanos, grosella, brécol, almendro, pistachero, avellano y nogal, esparrago, judía verde (sin vaina), garbanzo, espinaca, puerro y ornamentales en pulverización normal con tractor o manual, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + A1:2009) y calzado adecuado. Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

Invernadero: En tomate, pimiento, berenjena, fresa y ornamentales, en pulverización manual, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 6 de acuerdo con la norma UNE-EN 13034:2005+A1:2009). En tomate, pimiento, berenjena y ornamentales en pulverización hidroneumática desde el exterior, durante la mezcla, carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo, se deberán utilizar guantes de protección química, como mínima medida de protección individual. En tomate, pimiento,

berenjena y ornamentales en pulverización con instalaciones fijas automatizadas, durante la mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química. No entrar en el invernadero hasta finalizada la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de pulverización antes del comienzo de la aplicación del producto.

Seguridad del trabajador:

En tomate, pimiento, berenjena, apio, alcachofa, coliflor, canónigo, berro (mastuerzo), barbarea, rúcula, mostaza china, brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica), achicoria, diente de león, hierbas aromáticas y flores comestibles, laurel, fresal, y frambuesa, zarzamora, arándanos, y grosellas, escarola y ornamentales se deberán utilizar guantes de protección química para tareas que superen las dos horas.

En avellano, nogal, almendro y pistachero 13 días como periodo de reentrada para labores superiores a 2 horas; en lechuga, escarola, cebolla y ajo 7 días; en espárrago, judía verde (sin vaina), puerro, guisante y garbanzo, 5 días; y en brécol 4 días. No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

CARACTERÍSTICAS:

Blagal® es un fungicida formulado como gránulos dispersables en agua a base de Piraclostrobin y Boscalida, dos ingredientes activos con diferente modo de acción que actúan sobre el funcionamiento de las mitocondrias de los patógenos.

La Boscalida interrumpe la síntesis de componentes celulares esenciales, inhibiendo los procesos de crecimiento y de producción energética del hongo, mientras que Piraclostrobin actúa sobre los procesos de respiración mitocondrial.

Este doble modo de acción de BLAGAL® proporciona una excelente capacidad de control de enfermedades fúngicas en cultivos hortícolas y frutales.

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

v	Patógeno	Dosis de aplicación (kg/ha)	Volumen de caldo (l/ha)	Número de aplicaciones (max.)	Intervalo entre aplicaciones (días)	Condic. Específico	PS (días)
Ajo (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. Roya de la cebolla, <i>Puccinia porri</i>	1-1,5 kg/ha	500 - 1000	2	7-10	Pulverización normal con tractor o manual	14
Almendro (agrario, aire libre)	Abolladura, lepra del melocotonero, <i>Taphrina deformans</i> Cribado, perdigonado, <i>Wilsonomyces carpophilus</i> Mancha ocre del almendro, <i>Polystigma ochraceum</i> Monilia, <i>Monilinia</i> spp.	1 kg/ha	1000 - 1500	2	10-15	Pulverización normal con tractor o manual	28
Arándano, mirtilo (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. Oidio, <i>Microsphaera penicillata</i>	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	7-10	Pulverización normal con tractor o manual	3
Avellano, (agrario, aire libre)	<i>Alternaria</i> spp. Antracnosis, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> Cladosporiosis, <i>Cladosporium</i> spp Fusariosis, <i>Fusarium</i> spp	1 kg/ha	600 - 1500	2	10-15	Pulverización normal con tractor o manual	28
Berenjena, (agrario, aire libre, invernadero)	<i>Botrytis</i> spp. Oídio del tomate, <i>Oidium neolycopersici</i> <i>Sclerotinia</i> spp.	0,1-0,15 %	400 - 1000	3	7-10	Dosis máxima 1,5 kg/ha. <u>Aire libre</u>	.3

v	Patógeno	Dosis de aplicación (kg/ha)	Volumen de caldo (l/ha)	Número de aplicaciones (max.)	Intervalo entre aplicaciones (días)	Condic. Específico	PS (días)
						Pulverización normal con tractor o manual <u>Invernadero</u> Pulverización manual, fija automatizada ó hidroneumática desde el exterior.	
Brécol (agrario, aire libre)	Mancha negra, tizón de las crucíferas, <i>Alternaria brassicae</i>	1 kg/ha	400 - 1000	3	7-10	Pulverización normal con tractor o manual	14
Cebolla (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	7-10	Pulverización normal con tractor o manual	14
Escarola (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	1-1,5 kg/ha	400 - 600	2	7-10	Pulverización normal con tractor o manual	14
Espárrago (agrario, aire libre)	Podredumbre blanca, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> Roya del espárrago, <i>Puccinia asparagi</i>	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	10	Pulverización normal con tractor o manual	NP
Espinaca (agrario, aire libre)	Cladosporiosis de la espinaca, <i>Cladosporium variable</i> Mildiu de la acelga, <i>Peronospora farinosa</i> Antracnosis, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	1 kg/ha	400 - 1000	2	7-10	Pulverización normal con tractor o manual	14

v	Patógeno	Dosis de aplicación (kg/ha)	Volumen de caldo (l/ha)	Número de aplicaciones (max.)	Intervalo entre aplicaciones (días)	Condic. Específico	PS (días)
Frambueso (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. Oídio de la fresa, <i>Podosphaera aphanis</i>	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	7-10	Pulverización normal con tractor o manual	3
Garbanzo (agrario, aire libre)	Rabia del garbanzo, <i>Ascochyta rabiei</i> <i>Sclerotinia</i> spp	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	10	Pulverización normal con tractor o manual	7
Grosellero (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. Oídio del grosellero, <i>Microsphaera grossulariae</i> , <i>Podosphaera mors-uvae</i>	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	7-10	Pulverización normal con tractor o manual	3
Judía verde (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. Roya de la judía, <i>Uromyces appendiculatus</i> <i>Sclerotinia</i> spp.	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	10	Judía (sin vaina) Pulverización normal con tractor o manual	10
Lechuga (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	1-1,5 kg/ha	600 - 1000	2	7-10	Pulverización normal con tractor o manual	7
Nogal (agrario, aire libre)	<i>Alternaria</i> spp. Antracnosis, <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> Cladosporiosis, <i>Cladosporium</i> spp.	1 kg/ha	600 - 1500	2	10-15	Pulverización normal con tractor o manual	28



An Agricultural
Sciences Company

FMC Agricultural Solutions S.A.U

Pº de la Castellana, 257 – 5º

28046 Madrid

España

+34 915 530 104

fmcagro.es

v	Patógeno	Dosis de aplicación (kg/ha)	Volumen de caldo (l/ha)	Número de aplicaciones (max.)	Intervalo entre aplicaciones (días)	Condic. Específico	PS (días)
	Fusariosis, <i>Fusarium</i> spp.						
Pimiento (agrario, aire libre, invernadero)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp. Oídio del tomate, <i>Oidium Neolycopersici</i>	0,1-0,15 %	400 - 1000	3	7-10	Dosis máxima: 1,5 kg/ha. <u>Aire libre</u> Pulverización normal con tractor o manual <u>Invernadero</u> Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.	3
Puerro (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. Punta blanca, mildiu del puerro, <i>Phytophthora porri</i>	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	7-14	Pulverización normal con tractor o manual	21
Tomate (agrario, aire libre)	Oídio del tomate, <i>Oidium Neolycopersici</i> <i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	0,1-0,15 %	400 - 1000	3	7-10	Dosis máxima: 1,5 kg/ha <u>Aire libre</u> Pulverización normal con tractor o manual <u>Invernadero</u> Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.	3
Zanahoria	<i>Alternaria</i> spp.	1 kg/ha	400 - 1000	2	7-10		14

v	Patógeno	Dosis de aplicación (kg/ha)	Volumen de caldo (l/ha)	Número de aplicaciones (max.)	Intervalo entre aplicaciones (días)	Condic. Específico	PS (días)
(agrario, aire libre)	Oidio de la zanahoria, <i>Erysiphe heraclei</i>					Pulverización normal con tractor o manual	
Zarzamoras (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. Oídio de la fresa, <i>Podosphaera aphanis</i>	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	7-10	Pulverización normal con tractor o manual	3
Fresal (agrario, invernadero)	<i>Botrytis</i> spp. Oídio de la fresa, <i>Podosphaera aphanis</i>	1-1,8 Kg/ha	400 - 1000 l/ha	2	7-10	Pulverización manual.	3
Arbustos y pequeños árboles ornamentales (no agrario, aire libre, invernadero)	Oidios, Erysiphaceae <i>Botrytis</i> spp.	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	10	<u>Aire libre</u> Pulverización normal con tractor o manual. <u>Invernadero</u> Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.	NP
Coníferas (no agrario, aire libre, invernadero)	<i>Botrytis</i> spp. Oídios, Erysiphaceae	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	10	Exclusivamente para usos ornamentales. <u>Aire libre</u> Pulverización normal con tractor o manual. <u>Invernadero</u> Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.	NP



An Agricultural
Sciences Company

FMC Agricultural Solutions S.A.U

Pº de la Castellana, 257 – 5º

28046 Madrid

España

+34 915 530 104

fmcagro.es

v	Patógeno	Dosis de aplicación (kg/ha)	Volumen de caldo (l/ha)	Número de aplicaciones (max.)	Intervalo entre aplicaciones (días)	Condic. Específico	PS (días)
Frondosas (no agrario, aire libre, invernadero)	Oidios, Erysiphaceae <i>Botrytis</i> spp	1-1,5 Kg/ha	400 - 1000 l/ha	2	10	Exclusivamente para usos ornamentales. <u>Aire libre</u> Pulverización normal con tractor o manual. <u>Invernadero</u> Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.	NP
Ornamentales herbáceas (no agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. Oidios, Erysiphaceae	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	10	<u>Aire libre</u> Pulverización normal con tractor ó manual. <u>Invernadero</u> Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.	NP
Palmáceas (no agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. Oidios, Erysiphaceae	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	10	<u>Aire libre</u> Pulverización normal con tractor ó manual. <u>Invernadero</u> Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.	NP
	<i>Botrytis</i> spp.	1-1,5 kg/ha	400 - 1000	2	10		NP



An Agricultural
Sciences Company

FMC Agricultural Solutions S.A.U

Pº de la Castellana, 257 – 5º

28046 Madrid

España

+34 915 530 104

fmcagro.es

v	Patógeno	Dosis de aplicación (kg/ha)	Volumen de caldo (l/ha)	Número de aplicaciones (max.)	Intervalo entre aplicaciones (días)	Condic. Específico	PS (días)
Palmera datilera (no agrario, aire libre)	Oidios, Erysiphaceae					Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). <u>Aire libre</u> Pulverización normal con tractor o manual. <u>Invernadero</u> Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.	

Usos menores autorizados por procedimiento nacional (*)

Cultivo	Patógeno	Dosis de aplicación (kg/ha)	Volumen de caldo (l/ha)	Número de aplicaciones (max.)	Intervalo entre aplicaciones (días)	Condic. Específico	PS (días)
Coliflor	Mancha negra, tizón de las crucíferas, <i>Alternaria brassicae</i>	1 kg/ha	400 - 1000	3	7-10	Pulverización normal con tractor o manual. Aplicar entre BBCH 15-49.	14
Achicoria (hojas) (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	1,5 kg/ha	1000	2	7	Pulverización normal con tractor ó manual. Aplicar entre BBCH 15-47.	14
Alcachofa (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. Oidio, oidiopsis, <i>Leveillula taurica</i>	1 kg/ha	400 - 1000	2	7-10	Pulverización normal con tractor o manual. Aplicar entre BBCH 15-49.	14
Apio (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp.					Producción destinada a consumo de tallos y hojas.	
	Mildiu de las umbelíferas, <i>Plasmopara crustosa</i>	1,5 kg/ha	400 - 1000	2	10	Pulverización normal con tractor ó manual. - Para producción de tallos: dosis de 1 kg/ha. - Para producción de hojas de apio: dosis de 1,5 kg/ha.	Tallos 21 Hojas 14

						Aplicar entre BBCH 15-49	
Barbarea	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp	1,5 kg/ha	1000	2	7	Pulverización normal con tractor o manual Aplicar entre BBCH 15-47	14
Berro, mastuerzo (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp	1,5 kg/ha	1000	2	7	Pulverización normal con tractor o manual Aplicar entre BBCH 15-47	14
Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	1,5 kg/ha	1000	2	7	Pulverización normal con tractor o manual Aplicar entre BBCH 15-47	14
Canónigo (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	1,5 kg/ha	1000	2	7	Pulverización normal con tractor o manual Aplicar entre BBCH 15-47	14
Diente de león (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	1,5 kg/ha	1000	2	7	Pulverización normal con tractor ó manual Aplicar entre BBCH 15-47	14
Hierbas aromáticas y flores comestibles (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	1,5 kg/ha	400-1000	2	10	Pulverización normal con tractor o manual Aplicar entre BBCH 15-47	14

Laurel (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	1,5 kg/ha	400-1000 l/ha	2	10	Hojas aptas para el consumo humano Pulverización normal con tractor o manual Aplicar entre BBCH 15-47	14
Mostaza china (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	1,5 kg/ha	1000	2	7-10	Pulverización normal con tractor o manual Aplicar entre BBCH 15-47	14
Pistachero (agrario, aire libre)	Abolladura, lepra, <i>Taphrina</i> spp. Cribado, perdigonado, <i>Wilsonomyces</i> <i>carpophilus</i> Monilia, <i>Monilinia</i> spp. Uso secundario: <i>Botryosphaeria</i> spp.(contra <i>Botryosphaeria</i> <i>dothidea</i>).	1 kg/ha	1000 - 1500	2	10-15	Aplicar en pulverización normal. Aplicar desde el comienzo de la floración (BBCH 61) hasta que los frutos alcanzan el tamaño propio de su especie/variedad (BBCH 79).	28
Rúcula (agrario, aire libre)	<i>Botrytis</i> spp. <i>Sclerotinia</i> spp.	1,5 kg/ha	1000	2	7	Pulverización normal con tractor o manual Aplicar entre BBCH 15-47	14

PS: Plazo de seguridad

(*) Usos menores autorizados por procedimiento nacional:



An Agricultural
Sciences Company

FMC Agricultural Solutions S.A.U

Pº de la Castellana, 257 – 5º

28046 Madrid

España

+34 915 530 104

fmcagro.es

El uso en cultivos menores ha sido autorizado por procedimiento nacional. La eficacia del producto no ha sido justificada/documentada y no se han evaluado los posibles efectos adversos de los cultivos mencionados debido a la aplicación del producto. En relación con los usos mencionados, la empresa no se responsabiliza de los posibles fallos en la eficacia o selectividad del producto debido a su aplicación.

MODO DE EMPLEO:

El primer tratamiento se realizará cuando las condiciones medioambientales indiquen que existe riesgo de aparición de las enfermedades.

Para evitar la aparición de resistencias en los patógenos debe respetarse el número máximo de aplicaciones indicado, alternando con otros fungicidas de diferente modo de acción.

Calibrar el equipo de pulverización. Llenar el tanque del aplicador hasta sus $\frac{3}{4}$ partes y verter lentamente la dosis necesaria de BLAGAL®, con el agitador accionado, completando posteriormente el llenado del tanque.

Se podrá reentrar en las zonas tratadas una vez que la pulverización se haya secado

Aplicar en pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior en invernadero, y normal con tractor o manual al aire libre.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.