

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες - στόχοι - δόσεις - χρόνος & τρόπος εφαρμογής):

ΕΠΙΠΕΡΙΘΕΙΔΗ (Λεμονιά, Γκρέιφφρουτ, Μανταρίνι, Νεραντζιά, Πορτοκάλι): Εναντίον της Φυτόφθορας των καρπών (*Phytophthora* sp.) με δόση 267-400 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 400 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός στην αρχή αλλαγής χρώματος των καρπών (ΒΒCH 73). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Δαμασκινιά): Εναντίον του Εξώασκου (*Taphrina deformans*) με δόση 267-400 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 400 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή (BBCH<55 ή >9). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

ΑΚΡΟΔΑΥΑ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ): Εναντίον της Μυκοσφαίρελλας (*Mycosphaerella* sp.) με δόση 167-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 300 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 150-180. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ: Εναντίον των Βακτηριώσεων (*Xanthomonas* sp.) με δόση 222-267 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 400 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 150-180. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

ΑΜΠΕΛΙ: Εναντίον του Περονόσπορου (*Plasmopara viticola*) και της μαύρης σήψης (*Guignardia bidwellii*) με

δόση 238-396 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 238 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Τρεις (3) ψεκασμοί από την έκπτυξη του 3ου φύλλου έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 13-60). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 3/7. Για τους ίδιους εχθρούς με δόση 278 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 278 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 5 ψεκασμοί από την έναρξη της άνθησης έως την έναρξη ωρίμανσης των ραγών (BBCH 60-83). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7.

ΕΛΙΑ: Εναντίον του Κυκλοκόνου (*Spilocaea oleaginea*) και για Χρήσεις ήσσονος σημασίας: *Gloeosporium* (*Colletotrichum gloeosporioides**, *Colletotrichum acutatum**, *Colletotrichum dendatum**) με δόση 288 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 288 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή (BBCH<59 ή >89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

ΑΚΤΙΝΙΑ: Εναντίον της Βακτηρίωσης (*Pseudomonas syringae* ssp. *actiniae*) με δόση 117-176 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 176 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Δύο ψεκασμοί μετά την άνθηση (BBCH70). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/10 ή με δόση 240-360 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 360 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση ή μετά τη συγκομιδή (BBCH90). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

σε ημέρες: 1.

ΣΟΛΑΝΑΚΩΔΗ Τομάτα (Y+Θ), Μελιτζάνα (Y+Θ): Εναντίον του Περονόσπορου (*Phytophthora infestans*). Για καλλιέργειες υπαίθρου (Υ) με δόση 348-463 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 278 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-80. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πέντε (5) ψεκασμοί από την έκπτυξη του 5^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15-89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7. Για καλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ) με δόση 185-463 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (278 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-150. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πέντε (5) ψεκασμοί από την έκπτυξη του 5^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15-89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ Αγγούρι (Y+Θ), Κολοκυθί (Y+Θ): Εναντίον του Ψευδοπερονόσπορου (*Pseudoperonospora cubensis*). Για καλλιέργειες υπαίθρου (Υ) με δόση 278-926 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 278 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πέντε (5) ψεκασμοί από την έκπτυξη του 3^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 13->89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7. Για καλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ) με δόση 185-463 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (278κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-150. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πέντε (5) ψεκασμοί από την έκπτυξη του 3^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 13->89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7.

ΠΕΠΟΝΙ (Υ): Εναντίον του Ψευδοπερονόσπορου (*Pseudoperonospora cubensis*) με δόση 278-926 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 278 κ.εκ./στρ.).

11015834_11707_GREECE

11015834_11707_LBL_ML-B_5L_AIRONE_GR_3

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11015834	Base for Booklet	
Product SKU Description	5L_AIRONE_GR_3	Booklet	140x75
Label SKU	11707	Number of pages (Booklet)	2
Label SKU Description	LBL_ML-B_5L_AIRONE_GR_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-100.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Πέντε (5) ψεκασμοί από την έκπτυξη του 3^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 13>89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7.

ΣΚΟΡΔΟ (Υ), ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Υ): Εναντίον του Περονόσπορου (*Peronospora destructor*) με δόση 335-450 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 270 κεκ/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-80. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 4 ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων προεξέλιξης από το 5^ο φύλλο έως την ωρίμανση των βολβών (BBCH 14-47). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4/7.

ΠΑΤΑΤΑ: Εναντίον της *Phytophthora infestans* με δόση 386-515 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 309 κεκ/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-90. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4/7.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Εναντίον του Περονόσπορου (*Phytophthora* sp.), της Κερκόσπορας (*Cercospora* sp.), του Γλοιοσπόριου (*Gloeosporium* sp.), της Σκωρίωσης (*Puccinia* sp.) και των Βακτηριώσεων (*Pseudomonas syringae*) με δόση 278-463 κεκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση 278 κεκ/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πέντε (5) ψεκασμοί με την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 5/7.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ: Εναντίον του Περονόσπορου (*Phytophthora* sp.), της Κερκόσπορας (*Cercospora* sp.), του Γλοιοσπόριου (*Gloeosporium* sp.), της Σκωρίωσης (*Puccinia* sp.) και των Βακτηριώσεων (*Pseudomonas syringae*) με δόση 552-920 κεκ/100 λίτρα ψεκ.

υγρού (μέγιστη δόση 552 κεκ/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 60-100. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1.

Παρατηρήσεις: 1. Ενδέχεται η αποτελεσματικότητα κατά του *Xanthomonas* sp. στην καρυδιά να είναι μειωμένη. 2. Η συνολική εφαρμόζομενη ποσότητα καλλυνικών ακευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χάλκο). 3. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες επιτραπέζιου σταφυλιού Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα, στις ποικιλίες της ελιάς Κορωνέικη και Καλαμών, καθώς και στις καλλιεργειές καστανιάς, φουντουκιάς και καρυδιάς.

***«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στο γλοιοσπόριο της ελιάς. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της δόσης δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».**

Οδηγίες Χρήσης:

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το ψεκαστικό με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυθίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυθίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν

προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο/Βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα - 6 ώρες μετά την εφαρμογή σε υπαίθριες καλλιέργειες και - 8 ώρες μετά την εφαρμογή σε θερμοκήπια/κλειστούς χώρους.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Μπορεί να προκαλέσει κηλίδωση (spotting) στα επιτραπέζια σταφύλια. Μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία οινοποίησης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεπτικές χρήσεις: Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρίνι, Νεραντζιά, Γκιερίθρου, Πατάτα: 14 ημέρες. Ροδάκινά, Δαμασκηνιά, Ελιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Καστανιά: Μην εφαρμόζουμε. Αμπέλι: 21 ημέρες. Πεπόνι (Υ+Θ): 7 ημέρες. Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ): 3 ημέρες. Τομάτα (Υ+Θ) (για νωπή κατανάλωση), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Σκόρδο (Υ), Κρεμμυδί (Υ): 3 ημέρες. Ταμπάκο (Υ+Θ) (για βιομηχανική χρήση): 10 ημέρες. Ακτινίδα - 2 εφαρμογές: 20 ημέρες. Ακτινίδα - 1 εφαρμογή: Μην εφαρμόζουμε.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.