



Λίπασμα

Διαφυλλικό λίπασμα βορίου και μολυβδαινίου, ειδικά διαμορφωμένο για την μεγιστοποίηση της πρόσληψης από τα φυτά.

Λ.Τ. (Π Ι) (Μ Ι) - Ε.2.4.1. Ανόργανο λίπασμα από στερεά ή υγρά μείγματα θρεπτικών ιχνοστοιχείων (σύμφωνα με την ΥΑ 50424/2025)

Περιεχόμενο:

Βόριο (Β) διαλυτό στο νερό: 11,0% β/β, 14,9% β/ο
Μολυβδαίνιο (Μο) ως άλας νατρίου, διαλυτό στο νερό: 0,55% β/β, 0,74% β/ο
Ως διάλυμα.

Συστατικά: Προϊόντα αντίδρασης της Μονοιθανολαμίνης και του Βορικού οξέος (1:3) (CAS 26038-87-9).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε τον γιατρό.
 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε τον γιατρό.
- Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Αρ.παρτίδας/Ημερ.παραγωγής: Αναγράφεται επί της φιάλης

Παρασκευάζεται από την: FMC Agro Ltd,
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, Ch5 2DH,
UK. Tel: + 44 (0) 1244 537370

E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com, www.fmc-agro.co.uk

Τα FMC, FMC logo και Bo-La[®] είναι εμπορικά σήματα της
FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2025 FMC Corporation. All rights reserved.

11000787_22066813_GREECE

Καλλιέργειες - Δόσεις εφαρμογής για
διαφυλλικούς ψεκασμούς:

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι), Μαρούλι, Σπανάκι, Κουνουπίδι, Λάχανο, Πράσινα φασόλια, Αγκινάρα και Καρότο: 75-150κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων ανθέων και επανάληψη με την πτώση των πετάλων.

Κρεμμύδι, Σκόρδο: 75-150κ.εκ/στρέμμα.
Ξεκινήστε τις εφαρμογές μετά τον σχηματισμό των βολβών.

Φράουλες και μικροί καρποί: 100-125κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή λίγο πριν την ανθοφορία και επανάληψη κατά την πτώση των πετάλων.

Μηλοειδή (Μήλα, Αχλάδια), Ακτινίδια, Σύκα:
100-150κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, εάν απαιτείται.

Πυρηνόκαρπα (Βερίκοκο, Ροδάκινο, Δαμάσκηνο, Κεράσι, Νεκταρίνι), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Καστανιά): 100-150κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, εάν απαιτείται.

Αβοκάντο, Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλι, Μανταρίνι, Λεμόνι), Ελιά: 100-150κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή πριν από την άνθηση, επανάληψη κατά την πτώση των πετάλων.

Αμπέλι (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο): 100-125κ.εκ/στρέμμα. Πριν από την ανθοφορία, επαναλάβετε μετά το τέλος της ανθοφορίας, εάν απαιτείται.

Πατάτα: 100 κ.εκ/στρέμμα από την έναρξη της άνθησης (10% των ανθών ανοιγμένα). Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν απαιτείται μετά από 15-20 ημέρες. Για την αύξηση του μεγέθους των κονδύλων, 300-3500 κ.εκ/στρέμμα 15-20 ημέρες πριν από τη συγκομιδή ή/και την εφαρμογή αποξηραντικού.

Βαμβάκι: 75-150κ.εκ/στρέμμα: 1^η εφαρμογή με την εμφάνιση των χτενιών, 2^η εφαρμογή στην αρχή της ανθοφορίας και 3^η εφαρμογή όταν ανοίξει το 30% των καρυδιών.

Σιτηρά: Σιτάρι, Κριθάρι, Τριτικάλε, Βρώμη,
Σίκαλη: 75-100κ.εκ/στρέμμα. Κατά την
διόγκωση του κολεού του φύλλου σημαία.

Αραβόσιτος, Ζαχαρότευτλα, Ηλίανθος και
άλλοι ελαιούχοι σπόροι: 75-100 κ.εκ/στρέμμα.
Εφαρμογή πριν την άνθηση.

Όσπρια (Φασόλια, Ρεβίθια, Φακές, Μπιζέλια):

75-100κ.εκ/στρέμμα. Εφαρμογή στο τέλος του σταδίου διακλάδωσης και γρήγορης φυτικής ανάπτυξης, ή κατά την αρχική εμφάνιση λουλουδιών.

Για φυλλοβόλα δένδρα: Εφαρμογή στο στάδιο της μεταφύτευσης με 150-200 κ.εκ/στρέμμα.

Για εφαρμογή με στάγδην άρδευση: δόση 250-350 κ.εκ/στρέμμα.

Παρατηρήσεις: Το λίπασμα Bo-La® μπορεί να εφαρμοστεί σε καλλιέργειες όταν παρατηρείται ή αναμένεται έλλειψη Βορίου, αλλά μετά το στάδιο των 3 φύλλων ή όταν υπάρχει επαρκές φύλλωμα.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα ή εφαρμογή με στάγδην άρδευση.

Χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει αντικειμενική ανάγκη. Μην υπερβείτε την κατάλληλη δόσολογία.

Συνιστάται να χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του εδάφους και των ιστών όποτε είναι δυνατόν για την καθοδήγηση των εφαρμογών μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών για τη βελτιστοποίηση της κατάρστασης των θρεπτικών στοιχείων της καλλιέργειας.

Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν σε πολύ έντονο

Εάν είναι δυνατόν, οι ψεκασμοί να γίνονται νωρίς το απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα.

Συνιστάται οι παραγωγοί να ενημερώνονται από τους κατά τόπους γεωπόνους, για την ορθή χρήση της εκάστοτε περίπτωσης και την αποφυγή της υπερβολικής λίπανσης.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία ή τον διανομέα της εταιρείας για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. (www.fmc.com).

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν το ανοίξετε και το χρησιμοποιήσετε. Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να

είναι καθαρός. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του λιπάσματος Bo-La*, αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση. Ξεπλύνετε προσεκτικά το δοχείο, προσθέστε τα ξεπλύνματα στο ψεκαστικό δοχείο και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Διατηρήστε την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση.

Συνδυαστικότητα: Το λίπασμα Bo-La® είναι φυσικά και χημικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αγροχημικών προϊόντων. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Πάντα να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος συνεργάτη πριν το αναμειγέξετε με το λίπασμα Bo-La®.

Συνθήκες αποθήκευσης: Προστατεύστε το προϊόν από τον παγετό. Αποθηκεύστε το σε θερμοκρασίες πάνω από 5°C. Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό, καλά αεριζόμενο κατάλληλο χώρο. Μην αποθηκεύετε σε χώρους που έχουν άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

11000787_22066813_LBL_SL-F_1L_BO-LA_GR_5

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	270x130
Product SKU	11000787	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_BO-LA_GR_5	Booklet	
Label SKU	22066813	Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description	LBL_SL-F_1L_BO-LA_GR_5	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	