

UFI: TAYW-M2TA-5N4P-4CN5

ΠΡΟΣΟΧΗ



**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.**

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία
του (Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά
σε επιφανειακά ύδατα).

Τα FMC, FMC logo και Coragen® 20 SC είναι εμπορικά σήματα
της FMC Corporation ή και θυγατρικών της. ©2022 FMC
Corporation. All rights reserved



CORAGEN® 20 SC

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Εντομοκτόνο



Ομάδα 28 Εντομοκτόνο

chlorantraniliprole
(κλอรαντρανιλιπρόλ)

200 g/l

Εγγυημένη σύνθεση:

chlorantraniliprole 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 81,6% β/β

Κάτοχος της άδειας Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

Λ. Συγγρού 348, Κτίριο Β, 17674, Καλλιθέα
Τηλ. 211 1983903

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου
με προνυμφοκτόνο δράση για την
καταπολέμηση των πιο διαδεδομένων
λεπιδοπτέρων και ορισμένων κολεόπτρων
που προσβάλλουν διάφορες καλλιέργειες.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ /
ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
14579/6.9.2016

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους
οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη
ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα
επιφανειακά ύδατα για τα πυρηνόκαρπα
(εκ των οποίων 10 μέτρα με βλάστηση), 10
μέτρων για τα οπωροφόρα δέντρα και 5
μέτρων για το αμπέλι.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

500 κ.εκ €



11007092_22055486_GREECE

11007092_22055486_LBL_ML-F_500ML_CORAGEN 20SC_GR_4_BOOKLET,12pages.indd 1

30/04/2024 12:01

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR



	FILL IN		DIMENSION (WxH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11007092	Base for Booklet	
Product SKU Description	CORAGEN 20SC_500ML_GR	Booklet	BKL 230x95 mm (190x95 mm)
Label SKU	22055486	Number of pages (Booklet)	12 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_500ML_CORAGEN 20SC_GR_4	Carton label	
Label SKU (earlier version)	22045671 22051722	Preprinted Material	No

CORAGEN® 20 SC

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Εντομοκτόνο



Ομάδα

28

Εντομοκτόνο

chlorantraniliprole
(κλοραντρανιλιπρόλ)

200 g/l

Εγγυημένη σύνθεση:

chlorantraniliprole

20%

β/ο

Βοηθητικές ουσίες

81,6%

β/β

Τα FMC, FMC logo και Coragen® 20 SC είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της. ©2022 FMC Corporation. All rights reserved

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προνυμφοκτόνο δράση για την καταπολέμηση των πιο διαδεδομένων λεπιδοπτέρων και ορισμένων κολεόπττερων που προσβάλλουν διάφορες καλλιέργειες.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ / ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 14579/6.9.2016

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

Λ. Συγγρού 348, Κτίριο Β, 17674. Καλλιθέα

Τηλ. 211 1983903



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ**Σε περίπτωση εισπνοής:**

Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Το CORAGEN® 20SC δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση επαφής με το δέρμα. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση επαφής συστήνεται η καλή πλύση με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Το CORAGEN® 20SC δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση επαφής με τα μάτια. Αν ωστόσο υπάρξει επαφή ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν χρειαστεί, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Αναζητήστε άμεσα, ιατρική συμβουλή.

Περιέχει 1,2 βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 77.93.777

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: TAYW-M2TA-5N4P-4CN5

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.**

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το CORAGEN® είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προνυμφοκτόνο δράση για την καταπολέμηση των πιο διαδεδομένων λεπιδοπτέρων και ορισμένων κολεόπττερων που προσβάλλουν διάφορες καλλιέργειες. Καταπολεμά όλα τα προνυμφικά στάδια και περιορίζει την δράση των ακμαίων σε ορισμένα έντομα. Επίσης επιδεικνύει εξαιρετική ωο-προνυμφοκτόνο δράση. Περιέχει την δραστική ουσία chlorantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές

αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός καλύψεως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):

Για την καταπολέμηση της καρπόκαψας (*Cydia pomonella*, *Cydia molesta*), των φυλλοδετών (*Adoxophyes orana*, *Agryrotaenia pulchellana*, *Pandemis* spp.) του Ορρηγοπτερά *brumata*, της Οστρίνιας (*Ostrinia nubilalis*) και για τη Χρήση ήσσονος σημασίας *Spodoptera frugiperda*** πραγματοποιούνται ψεκασμοί καλύψεως με 16-20 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού στα στάδια BBCH 71-87. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση.

Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 12-14 ημέρες.

Για την καταπολέμηση των φυλλορυκτών (*Phyllonorychter blancardella*, *Ph. corylifoliella* & *Leucoptera scitella*), πραγματοποιούνται ψεκασμοί καλύψεως με 16-18 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Για τους φυλλορύκτες η επέμβαση συνιστάται να γίνει κατά την εναπόθεση των αυγών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Επανάληψη μετά από 14 ημέρες.

Ελάχιστη δόση /στρέμμα: 16 κ.εκ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 70-150

Ροδακινιά-Βερικοκιά

Για την καταπολέμηση της καρπόκαψας (*Cydia molesta*), της *Agryrotaenia pulchellana* και για τις Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Χρυσοκάνθαρος** (*Anomala vitis*) και *Spodoptera frugiperda*** πραγματοποιούνται ψεκασμοί καλύψεως με 16-20 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (στα στάδια BBCH 73-87). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες.

Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές.

Για την καταπολέμηση της ανάρσιας (*Anarsia lineatella*) πραγματοποιούνται ψεκασμοί καλύψεως με 18-20 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες.

Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 70-150

Δαμασκηλιά

Για την καταπολέμηση της Γκραφολίτας (*Cydia funebrana*, *Opheophthera brumata*) και για τις Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Χρυσοκάνθαρος** (*Anomala vitis*) και *Spodoptera frugiperda*** πραγματοποιούνται εφαρμογές στα στάδια BBCH 73-87 με δόση 16-20 κ.εκ/100λίτρα ψεκ. Υγρού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση.

Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους & επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες.

Για την Orthoptera brumata Εφαρμογή με την εμφάνιση των προνυμφών Ελάχιστη δόση /στρέμμα 16 κ.εκ.

Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 70-150

Πορτοκαλιά-Μανταρινιά-Λεμονιά - Σατσούμα - Γκρέιπ φρουτ :

Για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*P. citrella*) και για τη Χρήση ήσσονος σημασίας *Spodoptera frugiperda*** πραγματοποιούνται ψεκασμοί καλύψεως με 10-15 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού στα στάδια BBCH 31-50. Να χρησιμοποιηθεί πριν τα δένδρα εισέλθουν σε παραγωγική ηλικία. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα. Επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές

Ελάχιστη δόση /στρέμμα 5 κ.εκ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 10-50

Καρυδιά, Καστανιά, Αμυγδαλιά:

Για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας (*Cydia pomonella*) και για τη Χρήση ήσσονος σημασίας *Spodoptera frugiperda*** στην καρυδιά, της Καρπόκαψας (*Cydia pomonella*, *Cydia fagiglandan*), των Κολεοπτέρων (σκαθαριού) (*Curculio elephas*) και για τη Χρήση ήσσονος σημασίας *Spodoptera frugiperda*** στην

καστανιά και της Ανάρσιας (*Anarsia Lineatella*) και για τη Χρήση ήσσονος σημασίας *Spodoptera frugiperda*** στην αμυγδαλιά συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση των 18-20 ml σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Οι εφαρμογές να γίνονται όταν ξεκινά η διόγκωση των περικαρπίων έως το στάδιο όπου το 70% έχει ωριμάσει στα στάδια BBCH 73-87). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους. Επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες. Οι ψεκασμοί για την 2η γενιά καταστέλλουν την δράση του *Ragoletis completa*.

Ελάχιστη δόση /στρέμμα 18 κ.εκ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 100-150

Αμπέλι (Οινοποίησης): Για την καταπολέμηση της Ευδεμίδας (*Lobesia botrana*), της κογχυλίδας (*Eupoecilia ambiguella*), της *Argyrotaenia pulchellana* και για τη Χρήση ήσσονος σημασίας *Spodoptera frugiperda*** συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση των 15-18 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστη δόση 27 κ.εκ/στρέμμα) στα στάδια BBCH 57-83, λίγο πριν την ανθοφορία έως τον χρωματισμό του μούρου. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-150.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Αμπέλι (Επιτραπέζιο): Για την καταπολέμηση της Ευδεμίδας (*Lobesia botrana*), της κογχυλίδας (*Eupoecilia ambiguella*), της *Argyrotaenia pulchellana* και για τη Χρήση ήσσονος σημασίας *Spodoptera frugiperda*** συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση των 15-18 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστη

δόση 21,6 κ.εκ/στρέμμα) στα στάδια BBCH 57-85, λίγο πριν την ανθοφορία έως το PHL. Ελάχιστη δόση/στρέμμα 15 κ.εκ. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 50-120.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
Επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες.

Πατάτα:

Για την καταπολέμηση του δορυφόρου (*Leptinotarsa decemlineata*) συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση των 5-6 ml/στρέμμα στο στάδιο BBCH 31-69 (έως την ολοκλήρωση της άνθησης της 1ης ανθοφορίας). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή όταν είναι ορατές οι πρώτες διαβρώσεις. Επανάληψη μετά από 14-21 ημέρες. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές.

Για την καταπολέμηση της Φθοριμαίας (*Phthorimaea operculella*) και για τη Χρήση ήσσονος σημασίας *Spodoptera frugiperda*** συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση των 12,5-17,5 ml/στρέμμα στο στάδιο BBCH 31- 93 (έως το κιτρίνισμα των φύλλων). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή όταν είναι ορατές οι πρώτες πτήσεις ακμαίων. Επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-80

Καλαμπόκι, Γλυκό καλαμπόκι: Για την καταπολέμηση της Πυραλίδας (*O. nubilalis*), της Σεζάμιας (*Sesamia* spp.), του Πράσινου σκουληκιού (*H. armigera*), της Σποντόπτερας (*S. exigua*) και για τη Χρήση ήσσονος σημασίας *Spodoptera frugiperda*** συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση των 10-15 ml σκευάσματος/

στρέμμα (στάδια: T1=BBCH 14 -55 και T2=BBCH 73- 87). Η πρώτη εφαρμογή γίνεται από το 4ο φύλλο μέχρι την έκπτυξη του κορυφαίου θυσάνου. Η δεύτερη εφαρμογή γίνεται από το στάδιο της ανάπτυξης των σπόρων έως λίγο πριν την ωρίμανση.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-30 ημέρες
Ελάχιστη δόση εφαρμογής: 10 κ.εκ/στρέμμα

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-80

Βαμβάκι: Για την καταπολέμηση της Σποντόπτερας (*S. exigua*, *S. littoralis*), του Πράσινου σκουληκιού (*H. armigera*), του Ακανθώδους σκουληκιού (*Earias* spp.) και για τη Χρήση ήσσονος σημασίας *Spodoptera frugiperda*** συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση των 20 ml σκευάσματος/στρέμμα στα στάδια BBCH 34-77. Οι εφαρμογές να γίνονται από το στάδιο όπου το 40% των φυτών συναντιούνται μεταξύ των γραμμών έως το 70% των καψών να έχει αποκτήσει το τελικό μέγεθος.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-80

***Καπνός:** Για την καταπολέμηση της Φθοριμαίας (*Phthorimaea operculella*) και του Πράσινου σκουληκιού (*H. armigera*), και για την *Spodoptera frugiperda* συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση των 17,5 ml σκευάσματος/στρέμμα κατά την εναπόθεσή των αυγών ή με τις πρώτες πτήσεις των ακμαίων.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): : 100-150

***Κυδωνιά:** Για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας (*Cydia pomonella*), (*Cydia molesta*), των Φυλλοδετών (*Adoxophyes orana*, *Agryotaenia pulchellana*, *Pandemis spp*), του *Opherophtera brumata*, της Οστρίνιας (*Ostrinia nubilalis*) και για τη *Sporoptera frugiperda* συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση των 16-20 κ.εκ ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού στα στάδια BBCH 71-87.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 12-14 ημέρες.

Για την καταπολέμηση των Φυλλορυκτών (*Phyllonorychter blancardella*, *Ph. corylifoliella* & *Leucoptera scitella*) συνιστώνται ψεκασμοί στη δόση των 16-18 κ.εκ ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Για τους φυλλορύκτες συνιστάται η επέμβαση να γίνει κατά την εναπόθεση των αυγών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Επανάληψη μετά από 14 ημέρες.

Ελάχιστη δόση/στρέμμα: 16 κ.εκ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): : 70-150

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες του καπνού και της κυδωνιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος

της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του Χρυσοκάνθαρου (*Anomala vitis*) στις καλλιέργειες ροδακινιάς, βερικοκιάς, δαμασκηνιάς και κατά του *Sporoptera frugiperda* σε όλες τις καλλιέργειες. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Η δραστική ουσία chlorantraniliprole, ανήκει στην Ομάδα 28, σύμφωνα με την ταξινόμηση της επιτροπής IRAC (Insecticides Resistance Action Committee).

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εχθρών.
- Συνεχής και επαναλαμβανόμενη χρήση
- Οι εφαρμογές να γίνονται με την συνιστώμενη δόση και να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
- Το CORAGEN® να εφαρμόζεται μέχρι 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Να αποφεύγεται η χρήση του σε καλλιέργειες υπό στρές.
Κατά την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τα διαστήματα της ημέρας που οι επικονιαστές δραστηριοποιούνται έντονα. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές να λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει 2 ώρες μετά τον ψεκασμό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Βερικοκιά, Μήλα, Αχλάδια, Κυδωνιά: 14 ημέρες

Οινοποιήσιμο αμπέλι: 30 ημέρες

Επιτραπέζιο αμπέλι: 3 ημέρες

Καπνός: 1 ημέρα

Ακρόδρυα, βαμβάκι: 21 ημέρες

Εσπεριδοειδή: Μη εφαρμόσιμο

Καλαμπόκι, Γλυκό καλαμπόκι: 7 ημέρες

Πατάτα: 14 ημέρες

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο στο 1/4 ή στο 1/2 με νερό. Προσθέστε CORAGEN® απ ευθείας στο βυτίο. Αναδεύστε καλά ώστε το CORAGEN® να αναμειχθεί πλήρως με το νερό. Συνεχίστε την ανάδευση καθόλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Ψεκάστε την ίδια μέρα.

Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Συστήνεται να γίνεται δοκιμή μικρής κλίμακας του υπό παρασκευή μίγματος βυτίου και να αποφεύγονται μίγματα βυτίου με πολλά σκευάσματα. Το CORAGEN® δεν είναι συμβατό με παρασκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα.

Ξεπλύντε 3 φορές σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα.

Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Αποφύγετε την μακρά έκθεσή του σε θερμοκρασία μικρότερη των 0 °C, ή μεγαλύτερη των 40 °C.





