

FMC

Foskey® 80 WG

Fosetyl-Al (Φοσετύλ-αλ) 80% ● Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Διασυστηματικό ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ με
προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Εγγυημένη Σύνθεση: Fosetyl-Al: 80% β/β, Βοηθητικές ουσίες: 17,53% β/β

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 60917/10.01.2020

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

UFI: 4600-W0NS-M003-499Y

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



● Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
● Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yno-4,7-diol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. ● Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: ● Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. ● Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ● Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ● Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την εφαρμογή. ● Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι και γάντια. ● Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. ● Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ● **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ● Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ● **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. ● **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε το σκεύασμα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Καθαρό Βάρος (Net Weight): **2,5 κιλά (Kg)** e

Ημερομηνία Παραγωγής (Prod. Date): βλέπε συσκευασία (see pack)
Αριθμός Παρτίδας (Lot No.): βλέπε συσκευασία (see pack)

Κάτοχος της άδειας-Παρασκευαστής σκευάσματος: Industrial Química Key S.A.,
Avda. Cervera, s/n 25300 Tàrraga, Lleida, SPAIN (Ισπανία).

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 113 8614

Αποκλειστική Διάθεση:
FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα,
Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 113 8614

FMC



5 703265 571944

11002352_11520_ LBL_SL-F_2.5KG_FOSKEY 80WG_GR_3

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	212X300
Product SKU	11002352	Base for Booklet	
Product SKU Description	2.5KG_FOSKEY 80WG_GR_3	Booklet	
Label SKU	11520	Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description	LBL_SL-F_2.5KG_FOSKEY 80WG_GR_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	



Foskey® 80 WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και ταυτόχρονα ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες-Στόχος-Δόσεις-Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών):

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρουτ, Φράπα, Κίτρο, Περγαμόντο, Νεραντζιά): Εναντίον της Φυτόφθορα (*Phytophthora sp.*) με δόση 300 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (330-600 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 110-200 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 1ος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης (Απρίλιο-Μάιο), 2ος ψεκασμός τον Ιούλιο-Αύγουστο και 3ος ψεκασμός τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο (BBCH 37-81). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 3/30 ημέρες.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά): Δόση 300 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (300 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα/στρέμμα. Για Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (*Phytophthora cactorum*) 1ος ψεκασμός την άνοιξη, Απρίλιο-Μάιο, 2ος ψεκασμός τον Ιούνιο-Ιούλιο και 3ος ψεκασμός Οκτώβριο κατά το λήθαργο (BBCH 91-77). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 3/30 ημέρες. Για Βακτηρίωση (*Pseudomonas syringae*) ψεκασμοί από την πτώση των πετάλων έως το στάδιο των μικρών καρπών (BBCH 69-71). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 2/30 ημέρες.

ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια): Εναντίον του Περονόσπορου (*Plasmopara viticola*) με δόση 250 γρ./100 (250 γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης (BBCH 12-13). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 3/10 ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ (Υγαίθρου και Θερμοκηπίου): Εναντίον του Περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) με δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 4/10 ημέρες.

ΑΓΓΟΥΡΙ (Θερμοκηπίου): Εναντίον του Περονόσπορου (*Pseudoperonospora cubensis*) με δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 4/10 ημέρες.

ΜΑΡΟΥΛΙ (Υγαιθρου): Εναντίον του Περονόσπορου (*Bremia lactucae*) με δόση 250 γρ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί που ξεκινούν από το στάδιο των σποροφύτων (BBCH 10). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 4/10 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σταφύλια επιτραπέζια, Σταφύλια οινοποιήσιμα: 28 ημέρες. Μήλα, Αχλάδια, Αχλαδόμπλα, Κυδωνία, Μούσμουλα, Μαρούλια (Υ): 15 ημέρες. Πορτοκάλια, Περγαμόντα, Νεράντζια, Λεμόνια, Κίτρα, Μανταρινία, Γκρέιπ φρουτ, Φράπες: 14 ημέρες. Τομάτες (Υ+Θ), Αγγούρια (Θ): 3 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ: -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 30 ημέρες, -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιέργειών.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελειώς το ψεκαστικό βυτίο μετά τον ψεκασμό. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα:** Δε συνιστάται η ανάμειξη του σκευάσματος με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δε συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Καθαρό Βάρος (Net Weight): **2,5 κιλά (Kg)**

Αποκλειστική Διάθεση: **FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ**
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα,
Τηλ.: 211 198 3903, Fax: 211 113 8614

