



REBOOT

REBOOT

REBOOT

REBOOT

REBOOT

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το REBOOT είναι μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε πατάτες, τομάτες, μελιτζάνες και αμπέλια με προστατευτική και διασυστηματική δράση. Το cytoxinil συνεισφέρει στο σκεύασμα διευρύνοντας το φάσμα δράσης του ως διασυστηματικό και μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση. Επιπλέον δρα ανασταλτικά στη δημιουργία σπορίων από τον μύκητα. Το zoxamide είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εγκατάσταση της ασθένειας. Δρα εξειδικευμένα εναντίον των ωομυκήτων εμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση σταμινώντας την ανάπτυξη των μυκήτων και τη βλάστηση των σπορίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμογές με ψεκασμούς φυλλώματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο/οινοποιήσιμο): Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 35-40 γρ./στρέμμα (max). (35-200 γρ./100 λίτρα νερό). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-100 λίτρα/ στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Εφαρμογή από το στάδιο έκπτυξης του 4ου φύλλου και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7-10 μέρες με καλό λούσιμο των φυτών. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3.

ΠΑΤΑΤΑ: Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 45 γρ./ στρέμμα (max). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-100 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Εφαρμογή από το στάδιο της έκπτυξης του 1ου πτερυκτικού βλαστού (5 εκ.) και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7-10 μέρες με καλό λούσιμο των φυτών. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3.

ΤΟΜΑΤΑ (Υ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ): Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 40-45 γρ./στρέμμα (max). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-80 λίτρα/ στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Εφαρμογή από το στάδιο έκπτυξης του 3ου φύλλου και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 10 ημέρες κατ' ελάχιστο με καλό λούσιμο των φυτών. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3.

ΤΟΜΑΤΑ* (Θ) (χρήση ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του Στεμφύλιου. **Δόση:** 30 γρ./στρέμμα (max). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 80 λίτρα/ στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Εφαρμογή από το στάδιο έκπτυξης του 3ου φύλλου και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7-10 ημέρες με καλό λούσιμο των φυτών. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3.

Παρατηρήσεις:

1. Καλό είναι να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προεidoποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.
2. Αυξάνετε τον όγκο του ψεκαστικού καθώς η καλλιέργεια αυξάνει σε φυλλική επιφάνεια.
3. Προσαρμόστε τις δόσεις ανάλογα, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

* Για την ανωτέρω χρήση ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της τομάτας στο στεμφύλιο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Σταφύλια (Ε/Ο): 28 ημέρες, Τομάτες (Υ+Θ), Μελιτζάνες (Υ): 3 ημέρες, Πατάτες: 7 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδύοντας συνεχώς. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση ακόμα και κατά την εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των μπεκ. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ αναδύστε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να απομακρυνθούν τα ορατά υπολείμματα και ο σφρός. Φίλτρα και μπεκ αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Καύση σε εγκατεμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίπτημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

1. Η είσοδος των ανθρώπων να αποφεύγεται, αν δεν έχει πλήρως στεγνώσει το φύλλωμα των καλλιεργειών.
2. Όσοι εισέρχονται για εργασία σε καλλιέργειες αμτέλου μετά τον ψεκασμό, να φορούν υποχρεωτικά προστατευτικά γάντια.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης φαινομένων ανθεκτικότητας χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με πρόγραμμα επεμβάσεων, στο οποίο το REBOOT θα εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

REBOOT

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

UFI: CUJ0-M082-J00U-NT5P

Εγγυημένη σύνθεση: Cytoxinil 33% β/β

Zoxamide 33% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 34% β/β

Μυκητοκτόνο με διασυστηματική και προστατευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε αμπέλια, τομάτες, μελιτζάνες και πατάτες.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της άδειας – Υπεύθυνος κυκλοφορίας :
ΕΛΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2130065070



Περιεχόμενο: 200 γρ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί ερύσημα:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία..

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: Αφήστε μια αμέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά νερά. Σε περίπτωση χρήσης ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, αφήστε μία αμέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Φυλάξτε το σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Προστατεύστε το από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (παιγτό και > 40°C ζεστή). Στις παραπάνω συνθήκες το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

Ημ/νία παρασκευής / Αριθμός παρτίδας:
Βλέπε στην επιφάνεια του κουτιού.



REBOOT