



Seamac® Power

**ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ, ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ**

(σύμφωνα με την ΥΑ 50424/2025)

**Συμβάλει στην προώθηση της ανάπτυξης,
καθιστά περισσότερο διαθέσιμα τα
θρεπτικά συστατικά του εδάφους
και προσδίδει ανοχή στο αβιοτικό στρες.**

Σύνθεση: εκχύλισμα φυκιών
Ascophyllum nodosum min. 94% β/β
pH: 8,5 - 10,5
Οργανικός C: 23% β/β

Το SEAMAC® POWER είναι ένα υπερσυμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιών *Ascophyllum nodosum* σε μορφή πλήρως υδατοδιαλυτής μικροκοκκώδους σκόνης. Περιέχει σε πλήρη ισορροπία, αμινοξέα και άλλες οργανικές ουσίες που προωθούν την ορμονική διέγερση του φυτού.

Το SEAMAC® POWER είναι ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών, που όταν εφαρμόζεται σε κρίσιμα στάδια ανάπτυξης του φυτού, μειώνει τις επιδράσεις του αβιοτικού στρες και επιτρέπει στο φυτό να φτάσει πιο εύκολα στο πραγματικό δυναμικό και ποιότητα παραγωγής.

**Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο
σύμφωνα με τον CLP (REG EC 1272/2008)**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το SEAMAC® POWER μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε διαφυλλικά είτε με στάγδην άρδευση. Για μεταφυτευόμενα φυτά συνιστάται εμβάπτιση των φυταρίων σε διάλυμα 800 γρ. SEAMAC® POWER ανά 100 λίτρα νερό, 24 ώρες πριν τη μεταφύτευση. Χρησιμοποιείτε 20 λίτρα νερό για τα φυτά ενός στρέμματος.

Σε περίπτωση εφαρμογών με στάγδην άρδευση συνιστάται η δόση 80-100 γρ./στρ. (για 1600 φυτά/στρ.).

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα): με ψεκασμό φυλλώματος με δόση 80 γρ./στρ. από την μεταφύτευση και έως το τέλος του βιολογικού κύκλου με μεσοδιαστήματα 7-10 ημέρες.

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΡΑΜΒΕΣ: Εμβάπτιση των ριζών σε διάλυμα 800 γρ./100 λίτρα νερό κατά τη μεταφύτευση.

Για τα λάχανα επανάληψη στο στάδιο των 4-8 φύλλων με ψεκασμό φυλλώματος 80 γρ./στρ και κάθε 7-10 ημέρες. Για μπρόκολο, κουνουπίδι, λαχανάκια Βρυξελλών επανάληψη με 80 γρ./στρ. στην αρχή δημιουργίας της κεφαλής και κάθε 7-10 ημέρες.

Για μαρούλι και άλλα φυλλώδη επανάληψη με ψεκασμό φυλλώματος 80 γρ./στρ. όταν η ροζέτα έχει αποκτήσει το 30% του τελικού μεγέθους και επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες.

ΒΑΜΒΑΚΙ: με ψεκασμό φυλλώματος με δόση 80 γρ./στρ. ξεκινώντας από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων, επανάληψη στην εμφάνιση των χτενιών και στην έναρξη της καρπόδεσης.

ΠΑΤΑΤΕΣ: με ψεκασμό φυλλώματος με δόση 80 γρ./στρ. ξεκινώντας από το στάδιο διόγκωσης των στολόνων. Επανάληψη όταν οι κόνδυλοι αποκτήσουν μέγεθος 1,5-2 εκατοστά και μετά από 7-10 ημέρες.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ, ΠΡΑΣΟ: με ψεκασμό φυλλώματος με δόση 80 γρ./στρ. και εφαρμογή στο στάδιο 3-5 φύλλων. επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες.

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΜΠΕΛΙ: με ψεκασμό φυλλώματος με δόση 80 γρ./στρ. και εφαρμογή στην καρπόδεση. Επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες μέχρι την τελική ανάπτυξη του καρπού.

ΨΥΧΑΝΘΗ: με ψεκασμό φυλλώματος με δόση 80

γρ./στρ. και εφαρμογή όταν υπάρχει αρκετό φύλλωμα για την απορρόφηση του ψεκαστικού υγρού. Επανάληψη μετά από 15-20 ημέρες μέχρι την τελική ανάπτυξη του καρπού.

ΣΙΤΗΡΑ (σιτάρι, καλαμπόκι, ρύζι), ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: με ψεκασμό φυλλώματος με δόση 40 γρ./στρ. και εφαρμογή στο στάδιο των 3-6 φύλλων. Επανάληψη μετά από 15-20 ημέρες μέχρι την τελική ανάπτυξη του καρπού.

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ: με ψεκασμό φυλλώματος με δόση 80 γρ./στρ. και εφαρμογή σε νεαρό βλαστικό στάδιο. Επανάληψη κάθε 3-4 εβδομάδες μέχρι να εμφανιστούν οι ανθοφόροι οφθαλμοί.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΞΗΡΟ
ΜΕΡΟΣ.**

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες εξαιτίας πάγου, ξηρασίας ή άλλους παράγοντες. Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν σε πολύ έντονο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 25°C. Εάν είναι δυνατόν ψεκάστε αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού μέχρι τη μέση, αρχίστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος. Διατηρείστε την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ξεπλύνετε προσεκτικά το ψεκαστικό δοχείο μετά τη χρήση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το SEAMAC® POWER είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων. Να συμβουλευέστε πάντα τις οδηγίες ανάμιξης του άλλου προϊόντος. Αν δεν υπάρχουν, τοποθετείστε το SEAMAC® POWER πρώτο στο ψεκαστικό δοχείο και αφού βεβαιωθείτε ότι έχει διαλυθεί πλήρως, τοποθετείστε και το άλλο προϊόν. Διατηρείτε επαρκή ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Το SEAMAC® POWER είναι υγροσκοπικό. Διατηρείστε τη συσκευασία στεγνή και σφραγίστε τη ξανά μετά από κάθε χρήση. Καλό είναι να διατηρείτε το σάκο μέσα στο χαρτοκιβώτιο. Διατηρείται σε χώρο στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Αποφύγετε υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και έκθεση σε απ' ευθείας ηλιακό φως. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Περιεχόμενο:

10 κιλά

Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
από την FMC AGRO LIMITED,
Rectors Lane, Pentre, CH5 2DH,
Ηνωμένο Βασίλειο.

**Αριθμός παρτίδας:
Ημερ. παραγωγής:**



Τα FMC, FMC logo και Seamac® Power είναι εμπορικά
σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2021-2025 FMC Corporation. All rights reserved

Υπεύθυνος Διάρθεσης: **FMC Χημικά Ελλάς Μ.ΕΠΕ**

Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα

ΤΗΛ.: 211 198 3903 - ΦΑΞ: 211 113 8614

11014998_22066341_GREECE