



Seamac® Pro

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ, ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΔΙΑΛΥΤΟ ΥΓΡΟ (σύμφωνα με την ΥΑ 50424/2025)

Συμπυκνωμένο εκχύλισμα φυκιών (*Ascophyllum nodosum*) και ελεύθερων αμινοξέων για την διέγερση της ανάπτυξης των φυτών. Βελτιωτικό της δομής και ποιότητας του εδάφους.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εκχύλισμα φυκιών: 13,8% β/ο, Ολικά Αμινοξέα: 28,3% β/ο (εκ των οποίων Ελεύθερα L-αμινοξέα 22,1% β/ο) pH: 3.0 - 5.0, Οργανικός C: 22,7% β/ο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μπορεί να διαβρώσει τα μέταλλα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει βορικό οξύ. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777


Περιεχόμενο: **1 λίτρο**

Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη **FMC AGRO LIMITED**.
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, Ηνωμένο Βασίλειο.

Διανομή:

FMC Chemicals Hellas MEPE
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 198 3903 - ΦΑΞ.: 211 113 8614

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



UFI: VP91-03U8-XN4H-KD7U

Αρ. παρτίδας/Ημερ. παραγωγής:
Αναγράφεται επί της φιάλης

11003097_22055440_GRECCCE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- Το **Seamac Pro** είναι ένας ολοκληρωμένος βιοδιεγέρτης με φυσικές βιοδραστικές ουσίες.
- Το **Seamac Pro** συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης.
- Το **Seamac Pro** συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος και προάγει την αριστή φυτική ανάπτυξη (βελτίωση της άνθησης, καρπόδεσης, του μεγέθους και της ποιότητας των καρπών).
- Το **Seamac Pro** συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των φυτών και στην μείωση του μεταφυτευτικού στρες.

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Διαφυλλικές εφαρμογές:

Δενδρώδεις καλλιέργειες: Δόση 0,2 - 0,3% του όγκου του ψεκαστικού διαλύματος (200-300 κ.εκ σκευάσματος/100 λίτρα νερό). Εφαρμογές που αρχίζουν την περίοδο βλάστησης και συνεχίζονται στα στάδια της αρχής της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της μεγέθυνσης του καρπού. Αποτελεί επίσης σημαντική βοήθεια στα φυτά η εφαρμογή σε περιόδους στρεσαρίσματος. Προτεινόμενος αριθμός εφαρμογών 3-4 ανά καλλιερητική περίοδο.

Λαχανικά: Δόση 0,2 - 0,35% του όγκου του ψεκαστικού διαλύματος (200-350 κ.εκ σκευάσματος/100 λίτρα νερό). Συνιστάται μια πρώτη εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση με το νερό της άρδευσης (βλέπε οδηγίες στάγδην άρδευσης παρακάτω) για την αποφυγή του μεταφυτευτικού σοκ και την ισχυρότερη ανάπτυξη ριζικού συστήματος. Γενικά οι εφαρμογές σε περιόδους στρεσαρίσματος του φυτού βοηθούν στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπισή του. Οι εφαρμογές συνεχίζονται κατά την περίοδο βλάστησης και στα στάδια της αρχής της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της ανάπτυξης του καρπού. Προτεινόμενος αριθμός εφαρμογών 3-4 ανά καλλιερητική περίοδο. Για Υδροπονικές καλλιέργειες: Δόση 0,2 - 0,35% του όγκου του ψεκαστικού διαλύματος (200-350 κ.εκ σκευάσματος/100 λίτρα νερό).

Εκτατικές καλλιέργειες (Αραβόσιτος, σιτηρά, βαμβάκι, μηδική, πατάτα κλπ): Δόση 0,2- 0,3% του όγκου του ψεκαστικού διαλύματος (200-300 κ.εκ σκευάσματος/100 λίτρα νερό). Για ισχυρό ριζικό σύστημα, αντιμετώπιση καταστάσεων στρεσαρίσματος των φυτών και υγιή ανάπτυξη, συνιστώνται 2-3 εφαρμογές στα στάδια της εγκατάστασης της καλλιέργειας, στην αρχή της άνθησης και στην καρπόδεση.

Μεταφυτευόμενες καλλιέργειες: Δόση 0,1% του όγκου του ψεκαστικού διαλύματος (100 κ.εκ σκευάσματος/100 λίτρα νερό). Ψεκασμός της φυτείας 3-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση για αποφυγή του

μεταφυτευτού σοκ και δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος κατά την εγκατάσταση.

Καλλυπτικά: Δόση 0,2 - 0,35% του όγκου του ψεκαστικού διαλύματος (200-350 κ.εκ σκευάσματος/100 λίτρα νερό). 3-4 εφαρμογές κατά τη διάρκεια βλαστικής ανάπτυξης των φυτών.

Εφαρμογές μέσω άρδευσης:

Δενδρώδεις καλλιέργειες: Δόση 200-400 κ.εκ/στρέμμα. 3-4 εφαρμογές ανά καλλιερητική περίοδο που αρχίζουν την περίοδο βλάστησης και συνεχίζονται στα στάδια της αρχής της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της μεγέθυνσης του καρπού.

Λαχανικά: Δόση 200 κ.εκ/στρέμμα. Συνιστάται μια πρώτη εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση με το νερό της άρδευσης για την αποφυγή του μεταφυτευτικού σοκ και την ισχυρότερη ανάπτυξη ριζικού συστήματος. Γενικά οι εφαρμογές σε περιόδους στρεσαρίσματος του φυτού βοηθούν στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπισή του. Οι εφαρμογές συνεχίζονται κατά την περίοδο βλάστησης και στα στάδια της αρχής της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της ανάπτυξης του καρπού. Προτεινόμενος αριθμός εφαρμογών 3-4 ανά καλλιερητική περίοδο.

Καλλυπτικά: Δόση 200 - 300 κ.εκ/στρέμμα. 3-4 εφαρμογές κατά τη διάρκεια βλαστικής ανάπτυξης των φυτών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν σε πολύ έντονο ηλιακό φως ή σε ακραίες θερμοκρασίες. Εάν είναι δυνατόν, ψεκάστε το βράδυ ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα. Οι προτεινόμενες δόσεις μπορεί να ποικίλουν λόγω διαφορετικών τύπων εδάφους, διαφορετικών γεωργικών πρακτικών και καιρικών συνθηκών. Να συμβουλευέστε πάντα έναν τεχνικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν το ανοίξετε και το χρησιμοποιήσετε. Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να είναι καθαρός. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού με νερό μέχρι τη μέση, αρχίστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του Seamac Pro. Ξεπλύνετε προσεκτικά το δοχείο, προσθέστε τα ξεπλύματα στη δεξαμενή ψεκασμού, συμπληρώστε το μέγιστο και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Φοράτε προστατευτική μάσκα σε όλη τη διάρκεια. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το **Seamac Pro** είναι φυσικά και χημικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αγροχημικών προϊόντων. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Πάντα να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος πριν από την ανάμιξη με **Seamac Pro**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Προστατεύστε το σκεύασμα από τον παγετό. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 5°C. Κρατήστε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο κατάλληλο μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε άμεσες πηγές φωτός σε θερμότητας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

11003097_22055440_ LBL_SL-F_1L_SEAMAC PRO_GR_2

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	270x130
Product SKU	11003097	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_SEAMAC PRO_2	Booklet	
Label SKU	22055440	Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description	LBL_SL-F_1L_SEAMAC PRO_GR_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	