



FMC

TEMSA® SC

(Mesotrione 10% β/ο) Μεσοτριόν 10% β/ο

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στον Αραβόσιτο.

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Mesotrione 10 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 90,59 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)
70225/25-07-2017

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά**

Κάτοχος της άδειας:
GLOBACHEM N.V.
Brustem Industriepark -
Lichtenberglaan 2019,
3800 Sint-Truiden, Βέλγιο

Globachem
Your Crop Counts

Περιεχόμενο **1 λίτρο e**

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
Λεωφ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: +30 211 1983903
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 455701000

FMC

UF1: 9F30-D050-500G-974N **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Πολύ τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Υποπο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη
χρήση. Αποφεύγετε να αναπνεύετε σταγονίδια/
εκνεφώματα. Μην τρώτε, μην πίνετε ή
καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
πρόϊον. Τα μολυμμένα ενδύματα εργασίας
δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο
εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά
γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το
πρόσωπο. Να φοράτε κατάλληλη
προστατευτική ενδυμασία και γάντια, κατά την
ανάμειξη/ φόρτωση και εφαρμογή του
σκευάσματος καθώς και νυαλιά κατά την
ανάμειξη/ φόρτωση. Να φοράτε μακριμάνικο
πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την
επανέφοδο στην καλλιέργεια μετά τον
ψεκασμό. Διάθεση του περιεχομένου/
περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους
απομόκρυσης χημικών απόβλητων/
αποσκευασίων. Μην ρυπαίνετε το νερό με
το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής
κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των
συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες
επιφάνειες και τους δρόμους. Για να
προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να
αφήσετε μίαν φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα
επιφανειακά ύδατα: - 20 μέτρων για τη δόση των
150 κ.εκ./ στρ. - 10 μέτρων για τη δόση των 75
κ.εκ./ στρ. Για να προστατέψετε τα φυτά μη
στόχους: - να αφήσετε μίαν αψέκαστη
ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από τη μη
γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε
ακροφύσια μείωσης της διασποράς
του ψεκαστικού νέφους κατά 90%, για τη
δόση των 150 κ.εκ./στρ. - να αφήσετε μίαν
αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 3 μέτρων ή να
χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75 %
για τη δόση των 75 κ.εκ./ στρ.

11015776_11474_GREECE

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Για το φυτοπροστατευτικό προϊόν: αποσύρση σε υψηλές θερμοκρασίες σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις. Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Η εφαρμογή οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων πρέπει να απέχει 7 ημέρες πριν και 4 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Να μην εφαρμόζεται σε καλαμπόκι που προορίζεται για σποροπαραγωγή και σε γλυκό καλαμπόκι.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει mesotrione, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα F2 (27) κατά HRAC. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές: ● Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ). ● Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο, στον ίδιο αγρό μπορεί να εναπαρθεί μόνο αραβόσιτος, την ίδια καλλιεργητική περίοδο αφού προηγηθεί άρση. -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί να σπαρθούν: το φθινόπωρο: - χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη), - ελαιοκράμβη μετά από βαθιά άρση (> 15 εκ.) την άνοιξη: - ανοιξιάτικα σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη), αραβόσιτος, - ηλιανθος, αφού προηγηθεί βαθιά άρση. -Να μη σπέρνονται: Βαμβάκι, πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και χαχαρότευλα, παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φαγόλι και σόγια, πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. -της πρόβωσης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Μη φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (τεύλα, σπανάκι, μπιζέλια, σόγια, τριφύλλι, λαχανικά). Πιθανή εμφάνιση λεύκανσης των φύλλων του καλαμπόκιού υπό συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας ή έντονων μεταβολών της θερμοκρασίας, είναι παροδικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει τη αποδόσεις.

Αριθμός παρτ.	Βλέπε συσκευασία
Ημερομ. Παραγ.	Βλέπε συσκευασία

Τα FMC, FMC logo είναι εμπορικά σήματα
της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2024 FMC Corporation. All rights reserved.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στον Αραβόσιτο. Απορροφάται κυρίως και ταχέως από τα φύλλα. Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των τρικετονών παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

Τρόπος εφαρμογής:

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος, υπό συνεχή ανάδευση, με 11-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα (ανάλογα με την ανάπτυξη των ζιζανίων). Βεβαιωθείτε ότι τα ψεκαστικά έχουν ρυθμιστεί σωστά πριν την εφαρμογή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό, μέχρι τη μέση και προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, με συνεχή ανάδευση κατά την διάρκεια του ψεκασμού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (πεδίο εφαρμογής, στόχος, δόσεις, όγκος ψεκ. υγρού, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

Αραβόσιτος:

Εναντίον των ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων με δόση 75 κ.εκ./στρέμμα και εναντίον της μouxρίτσας (*Echinochloa crus-galli*) με δόση 150 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 11-40 λίτρα/στρέμμα.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Ψεκασμός Φυλλώματος από το στάδιο των 2 έως το στάδιο των 9 φύλλων της καλλιέργειας BBCH (12-19). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις:

1. Ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Άγριο βλήτο (*Amaranthus hybridus*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*).

2. Στην δόση των 150 κ.εκ. / στρέμμα περιορίζει την ανάπτυξη ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων και κύπερης.

3. Η καλύτερη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν η εφαρμογή γίνεται από το φύτρωμα μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων των πλατύφυλλων ζιζανίων και στο στάδιο των 1-3 φύλλων των αγρωστωδών ζιζανίων.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

ΓΕΝΙΚΑ:

Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατό).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο.

Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:

Ξεπλύνετε το στόμα. Να ΜΗΝ προκληθεί εμετός. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:

Μετακινείστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατείστε τον σε ανάπαυση.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Αραβόσιτος: Δεν εφαρμόζεται.

Καθορίζεται από το στάδιο της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Μετά τον ψεκασμό και για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος.

Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, την υγρασία και τον παγετό.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.